

KLINISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUR FRAGE DER INDIKATION ZUR CHROMOSOMENANALYSE

Vergleichende Untersuchung der anamnestischen und klinischen Befunde von 31 Patienten mit verschiedenen autosomalen Chromosomenaberrationen, 32 Patienten mit multiplen morphologischen Anomalien und statisch-geistiger Retardierung unbekannter Ätiologie und 100 zufällig ausgewählten Klinikpatienten

von

Klaus Peter Grosse

1976

1976 № 259

Aus der Kinderklinik mit Poliklinik
der Universität Erlangen-Nürnberg
Direktor: Prof. Dr. med. A. Windorfer

KLINISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUR FRAGE DER INDIKATION ZUR CHROMOSOMENANALYSE

Vergleichende Untersuchung der anamnestischen und klinischen
Befunde von 31 Patienten mit verschiedenen autosomalen Chromo-
somenaberrationen, 32 Patienten mit multiplen morphologischen
Anomalien und statisch-geistiger Retardierung unbekannter Ätiologie
und 100 zufällig ausgewählten Klinikpatienten


Dem Fachbereich Medizin
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg
als Habilitationsschrift

vorgelegt
von
Klaus Peter Grosse



Tag der Habilitation: 15. 7. 1976

Einführung	1
Patienten und Methode	3
Patienten	3
Befunderhebung und Dokumentation der Befunde	5
Methodik der Befundauswertung	10
Ergebnisse	11
Befunde der Patienten mit Chromosomen- störung	11
Vergleich der Befunde der verschiedenen Patientengruppen	16
Diskussion	21
Zusammenfassung	26
Tabelle und Abbildungen	28
Literaturverzeichnis	49
Anhang	54
Erhebungsbogen	54
Tabellarische Darstellung der Befunde der einzelnen Patienten	57



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41546220_0092

EINLEITUNG

Autosomale Chromosomenaberrationen sind eine der Ursachen für angeborene Mißbildungen und statisch - geistige Retardierung. Über die diagnostische Bedeutung hinaus ist die Aufdeckung einer Chromosomenstörung bei einem Patienten wichtig für die Abschnätzung der Prognose, die Einleitung geeigneter entwicklungsfördernder Maßnahmen und für die genetische Beratung der betroffenen Familien.

In der Praxis - und insbesondere für den Kinderarzt - stellt sich das Problem, bei welcher Symptomenkombination an das Vorliegen einer autosomalen Chromosomenstörung gedacht und eine Chromosomenanalyse veranlaßt werden sollte.

Die Merkmalsmuster der Trisomie 21 (Mongolismus), der Trisomie 18 (Edwards-Syndrom) und der Trisomie 13 (Patau-Syndrom) sind so charakteristisch und auch allgemein bekannt, daß der Verdacht auf das Vorliegen dieser Chromosomenstörungen sich in der Regel aus dem typischen klinischen Bild ergibt. Die Merkmalskombinationen bei anderen autosomalen Chromosomenaberrationssyndromen (5, 24) sind weniger bekannt und auch meist klinisch weniger deutlich abgrenzbar.

Bisher war es üblich, eine Chromosomenanalyse zu veranlassen, wenn bei einem Patienten multiple morphologische Anomalien und statisch - geistige Retardierung vorlagen und eine andere Ursache für diese Störungen nicht eindeutig bekannt war. Diese Kriterien umfassen eine große Patientengruppe und sind in Bezug auf das, was im einzelnen unter morphologischen Anomalien zu verstehen ist, nicht exakt definiert. Nach den bisherigen Ergebnissen cytogenetischer Untersuchungen ist dies aber die bislang beste Indikationsstellung, um auch Patienten mit weniger bekannten oder bisher nicht bekannten autosomalen Chromosomenaberrationen zu erfassen (21).

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, ob sich für diese Patientengruppe charakteristische Merkmale oder Merkmalskombinationen herausstellen lassen, die ein gezielteres Suchen nach diesen Patienten ermöglichen.

Dazu wurden nach einem einheitlichen Erhebungsschema anamnestische und klinische Daten von 51 Patienten der Universitäts-Kinderklinik Erlangen mit autosomalen Chromosomenaberrationen (außer Trisomie 21, 18, 15) aus dem Untersuchungszeitraum von 1966 - September 1975 erfasst und ausgewertet. Nach dem gleichen Schema wurden entsprechende Daten erhoben bei 100 zufällig ausgewählten Klinikpatienten und bei 52 Patienten mit statisch - geistiger Retardierung und multiplen morphologischen Anomalien unbekannter Ätiologie, bei denen die Chromosomenuntersuchung einen normalen Befund ergeben hatte. Die Merkmale, in denen sich die Patienten mit Chromosomenstörungen deutlich von der Klinikpopulation unterscheiden, werden herausgestellt. Es wird geprüft, ob diese Merkmale geeignet sind, die Patienten mit Chromosomenstörungen von den Patienten mit multiplen Dysmorphien und statisch - geistiger Retardierung ohne Chromosomenstörung zu unterscheiden.

PATIENTEN UND METHODE

Patienten

Die Untersuchung beruht auf anamnestischen und klinischen Befunden von 3 verschiedenen Patientengruppen:

I. 31 Patienten mit autosomalen Chromosomenaberrationen.

Diese Gruppe umfaßt 31 der 180 Patienten aus der Universitäts-Kinderklinik Erlangen, bei denen im Zeitraum von 1900 - September 1975 eine autosomale Chromosomenaberration festgestellt wurde (Tabelle 1). Patienten mit Trisomie 21, 18 und 13 wurden nicht in die Untersuchung eingeschlossen, weil die klinischen Veränderungen bei diesen Chromosomenstörungen allgemein bekannt und so charakteristischen sind, daß die Erkennung solcher Patienten in der Regel keine Schwierigkeiten macht. Von den restlichen 33 Patienten mit weniger bekannten oder neuen, bisher noch nicht beschriebenen Chromosomenstörungen konnten 2 (1 Patient mit Trisomie 16 im Mosaik und 1 Patient mit 18 q- im Mosaik) nicht in die Untersuchung einbezogen werden, da die zur Verfügung stehenden Befundunterlagen für die Auswertung nicht ausreichten. - Die Chromosomenuntersuchungen wurden bei allen Patienten im Institut für Humangenetik und Anthropologie der Universität Erlangen - Nürnberg (Direktor: Prof. Dr. G. Koch) von Frau Dr. Schwanitz durchgeführt. In Tabelle 2 sind die Chromosomenbefunde der 31 Patienten zusammengestellt. Bei den Chromosomenstörungen handelt es sich außer einem Fall mit Trisomie im Mosaik um strukturelle Aberrationen. Mit einer Ausnahme (2 Patienten mit Deletion am kurzen Arm eines Chromosoms 5) lagen bei allen Patienten unterschiedliche Chromosomenstörungen vor.

II. 32 Patienten mit multiplen morphologischen Anomalien und statisch - geistiger Retardierung unbekannter Ätiologie, bei denen die Chromosomenuntersuchung einen normalen Befund ergeben hatte.

Die Chromosomenanalyse war in all diesen Fällen veranlaßt worden, weil bei diesen Patienten mehrere, auf verschiedene Körperregionen verteilte morphologische Auffälligkeiten vorlagen und eine statisch - geistige Retardierung bestand. Die Patientengruppe II enthält nicht alle Patienten der Universitäts-Kinderklinik Erlangen, die diese Voraussetzungen erfüllen, sondern nur die, bei denen die Befunderhebung für die Auswertung ausreichend war. - Bei 19 dieser 32 Patienten wurden neben den konventionellen Methoden der Chromosomendarstellung Strukturanalysen durchgeführt. Bei einem Patienten wurde zusätzlich eine Chromosomenuntersuchung an Fibroblasten, bei 4 Patienten auch eine Chromosomenuntersuchung der Eltern durchgeführt. Bei diesen Untersuchungen ergab sich kein Hinweis für eine Chromosomenstörung bei diesen Patienten.

III. 100 Klinikpatienten mit verschiedenen Erkrankungen.

Die Patienten wurden ohne vorherige Kenntnis der Diagnose anhand der alphabetischen Namenskartei der Klinikpatienten ausgewählt und entsprechend der Altersverteilung in Gruppe I geschichtet. Die Befunde dieser Patienten wurden erhoben, um einen Überblick über die Häufigkeit der in der Untersuchung berücksichtigten anamnestischen und klinischen Merkmale in der Klinikpopulation zu erhalten.

Das Geschlechtsverhältnis ist in den Gruppen I und III gleich (Gruppe I: 19 weiblich, 12 männlich; Gruppe III: 61 weiblich, 39 männlich). Die Geschlechtsverteilung der Patienten in Gruppe II weicht davon leicht ab (16 weiblich, 16 männlich).

Die Altersverteilung der Patienten, bezogen auf den Zeitpunkt der Untersuchung, zeigt eine gute Übereinstimmung in den Gruppen I und III und weicht in der Gruppe II nicht wesentlich davon ab (Abbildung 1).

Befunderhebung und Dokumentation der Befunde

Die klinische Untersuchung wurde in fast allen Fällen vom gleichen Untersucher durchgeführt. Nur bei 5 Patienten mit Chromosomenstörungen - 4 davon waren vor mehr als 5 Jahren in der Universitäts-Kinderklinik Erlangen untersucht worden - war dies nicht möglich. Da jedoch auch bei diesen Patienten die Befunde hinreichend dokumentiert waren (Fotos, Krankenblatt), wurden sie in die Untersuchung einbezogen.

Die Untersuchung der Patienten aus Gruppe I und II fand in den meisten Fällen statt, bevor das Ergebnis der Chromosomenanalyse bekannt war.

Die Befunderhebung umfaßte (vergl. auch Erhebungsbogen im Anhang): Stammbaumanalyse, Schwangerschaftsanamnese, Geburtsanamnese, Entwicklungsanamnese des Patienten; klinische Untersuchung (untersuchte Merkmale siehe Erhebungsbogen); Zusatzuntersuchungen (diese Untersuchungen wurden jeweils nur bei einem Teil der Patienten durchgeführt): Röntgenuntersuchungen des Skeletts, Echoencephalogramm, Elektroencephalogramm, ophthalmologische Untersuchung (durchgeführt von den Konsiliarärzten der Universitäts-Augenklinik Erlangen), kardiologische Untersuchungen, verschiedene Laboruntersuchungen.

Bei der Gruppe III wich die Befunderhebung in folgenden Punkten hiervon ab: Die Angaben zur Familien-, Schwangerschafts- und Geburtsanamnese beschränken sich bei dieser Gruppe auf die im Krankenblatt angegebenen Daten. Befunde von Zusatzuntersuchungen und die Entwicklungsanamnese wurde nicht registriert.

Alle Patienten der Gruppe I und II wurden fotografiert, wobei möglichst ein Ganzkörperfoto, Fotos vom Kopf von vorn und seitlich und Detailfotos auffälliger Körperregionen angefertigt wurden.

Die Befunde der Patientengruppe I und II sind im Anhang für jeden einzelnen Patienten unter der entsprechenden Fallnummer tabellarisch zusammengestellt. Es wurden dabei einige Merkmale zusätzlich mit aufgenommen, die auf dem Erhebungsbogen nicht ausdrücklich vermerkt sind, die aber mitgeprüft wurden (Zenenstellungsanomalien, großer Mund, Phalangenhypoplasie). Einige Merkmale wurden begrifflich eingengt oder erweitert (Zahnstellungsanomalien statt Zahnanomalien, kurzer Hals statt breiter und kurzer Nacken, Thoraxdeformität statt Schildthorax). Einige andere Merkmale wurden weggelassen, da sie im vorliegenden Zusammenhang unbedeutend (z. Bspl. Fontanellengröße) oder nicht gut genug beurteilbar (z. Bspl. meist offener Mund) waren.

Falls außer den in den Tabellen im Anhang aufgeführten Merkmalen pathologische Besonderheiten beobachtet wurden, sind diese für jeden einzelnen Fall am Schluß der Tabellen angegeben.

Definition der klinischen Merkmale:

Epikanthus: Senkrecht verlaufende Hautfalte, den inneren Lidwinkel ganz oder teilweise verdeckend.

Brushfield'sche Flecken: Deutliche fleckförmige Verdichtungen des Irisstromas.

Tiefsitzende Ohren: Der obere Rand der Ohrmuschel liegt in der seitlichen Ansicht des Kopfes unterhalb einer sagittalen Linie durch den äußeren Lidwinkel.

Dysplastische Ohren: Größere Abweichungen der Ohrmuschel von der normalen Form, etwa: Anotie, Mikrotie, gefaltete Helix.

Abnormes Genitale: Hypospadie, deutliche Abweichung der Penisgröße, Clitorishyperplasie und andere deutliche Abweichungen von der normalen Form und Größe der äußeren Genitalorgane.

Vierfingerfurche: Typische Vierfingerfurche: die distale Beugefurche der Mittelhand verläuft quer über die gesamte Handfläche.

Sydneylinie: die proximale Beugefurche der Mittelhand verläuft quer über die gesamte Handfläche. **Atypische Vierfingerfurche:** brückenartige Verbindung der distalen und proximalen Beugefurche durch eine zusätzliche Beugefurche.

Fingerkontrakturen: Passives Strecken der Fingergelenke nicht möglich.

Dysplastische Finger- und/oder Zehennagel: Deutliche Nagelverformungen, hypoplastische Nägel.

Klinodaktylie des Kleinfingers: Deutliche Einwärtskrümmung des Kleinfingerengliedes.

Kurzer Kleinfinger: Die Spitze des Kleinfingers erreicht nicht die distale Beugefurche des Ringfingers.

Sonstige Phalangenhypoplasie: Reduktionsanomalien der Finger- und Zehenphalangen mit feinen oder sehr deutlicher Verkürzung einzelner Phalangen (außer lediglich kurzem Kleinfinger).

Plantarfurche (1. Zwischenzehenraum): Deutliche Furche auf der Fußsohle, ausgehend vom Zwischenraum zwischen 1. und 2. Zeh.

Fußaeformitäten: Schwerere, behandlungsbedürftige Abweichungen von der normalen Form und Haltung des Fußes: Klumpfuß, Hackenfuß, Hohlfuß, "Tintenlöscherfüsse" (hochgradiger Pes calcaneovalgus), schwere Formen von Platt- und Knick-Platt-Fuß. Leichtere Formen des Sichelfußes wurden nicht als Fußaeformität gewertet.

Zehenstellungsanomalien: Zehen übereinander gelegen.

Muskelnhypotonie: Deutlich verminderter Muskeltonus mit Überstreck- und Überbeugbarkeit der Gelenke.

Muskelhypertonie: Deutlich gesteigerter Muskeltonus.

Herzfehler: Falls durch kardiologische Untersuchungen (EKG, Phonokardiogramm, Röntgenaufnahme des Thorax, Herzkatheteruntersuchung) und/oder Sektionsbefund sicher nachgewiesen.

Verdacht auf Herzfehler: Klinischer Verdacht (Herzgeräusch, ohne das durch kardiologische Untersuchungen der sichere Nachweis eines Herzfehlers erbracht wurde.

Die geistige Entwicklung wurde abgeschätzt nach folgenden Kriterien (in Anlehnung an die in den USA (57) gebräuchliche Einteilung der Schweregrade des Schwachsinn):

leichte Retardierung, bildbar (entspricht einem E_q von 0,5 - 0,75); mittelschwere Retardierung, erziehbare (entspricht einem E_q von 0,55 - 0,5); schwere Retardierung (entspricht einem E_q von 0,2 - 0,55); sehr schwere Retardierung (entspricht einem E_q unter 0,2).

In den Fällen, wo ein Entwicklungstest nach Bühler-Metzer durchgeführt werden konnte, ist der Entwicklungsquotient mit angegeben. In den anderen Fällen wurde die Schwere der geistigen Entwicklungsverzögerung lediglich geschätzt und in der Tabelle mit + (leicht) bis ++++(sehr schwer) angegeben.

Die Percentilen für Körpergröße, Körpergewicht, Kopfumfang, Geburtsgewicht und Geburtslänge wurden nach folgenden Quellen ermittelt: Normalwertangaben des Children's Medical Center, Boston; Documenta Geigy - Wissenschaftliche Tabellen; Normwerte für den Kopfumfang nach Meierli (20); Lubchenco (25).

Nach den anamnestischen Daten über Schwangerschaftsdauer und Geburtsgewicht wurden unterschieden: Frühgeborene (Geburt vor der 38. Schwangerschaftswoche, Geburtsgewicht über der 10. Percentile), Früh-Mangelgeborene (Geburt vor der 38. Schwangerschaftswoche, Geburtsgewicht unter der 10. Percentile), Mangelgeborene (Geburt nach der 38. Schwangerschaftswoche, Geburtsgewicht unter der 10. Percentile).

- - -

Das Knochenalter wurde bestimmt nach dem Atlas von Greulich und Pyle (11).

Eine Reihe von klinischen Merkmalen kann eindeutig festgestellt werden:

Lippen-, Kiefer- oder Gaumenspalte, Mikro- und Anophthalmie, Katarakt, Kolobom, atretischer Genorgang, praaurikuläre Grübchen und Anhangsel, Zahnstellungsanomalien, Rectusdiastase, Nabelbruch, Leistenbruch, Kryptorchismus, nur 1 Beugefurche am Kleinfinger.

Die Erfassung einiger Merkmale ist abhängig vom Alter der Patienten: Ob ein Strabismus vorliegt, kann mit genügender Sicherheit erst nach dem 1. Lebenshalbjahr festgestellt werden. Die Schwere einer statisch - geistigen Entwicklungsverzögerung ist erst im späteren Säuglingsalter genügend sicher zu beurteilen. Aus diesem Grund wurde auf die Angabe dieser Befunde bei Patienten unter einem halben Jahr verzichtet. Die Erfassung von Zahnstellungsanomalien ist natürlich abhängig vom Dentitionszeitpunkt.

Die übrigen Merkmale lassen sich nicht exakt definieren. Die Entscheidung, ob das Merkmal vorhanden war oder nicht, erfolgte nach dem subjektiven Eindruck des Untersuchers.

In den Befundtabellen (Anhang) wurde bei schwächerer Merkmalsausprägung ein (+) - Zeichen angegeben. Bei der Befundauswertung wurde dies aber nicht berücksichtigt. Es wurde dabei unabhängig von der Intensität der Merkmalsausprägung lediglich bewertet, ob ein Merkmal vorhanden war oder nicht.

Wo aus den oben angegebenen Gründen oder infolge unvollständiger Datenerfassung keine Angaben vorliegen, ist dies durch einen Schrägstrich in den Befundtabellen gekennzeichnet.

Methodik der Befundauswertung

Die anamnestischen und klinischen Befunde der Patienten-
gruppe mit autosomalen Chromosomenaberrationen werden be-
schrieben.

Die verschiedenen Patientengruppen werden hinsichtlich der
Häufigkeit der einzelnen Merkmale verglichen mittels Vierfel-
dertests (Chi-Quadrat- und Fisher-Test) (31).

Die Merkmale, die bei den Patienten mit Chromosomenstörungen
signifikant häufiger vorkommen als in der Stichprobe der zu-
fällig ausgewählten Klinikpatienten, werden herausgestellt.

Es wird geprüft, ob hinsichtlich der Anzahl dieser Merkmale
beim einzelnen Patienten ein Unterschied zwischen den Pa-
tienten mit autosomalen Chromosomenstörungen (Gruppe I)
und den Patienten mit multiplen morphologischen Anomalien
und statisch - geistiger Retardierung ohne Chromosomenstö-
rung (Gruppe II) besteht und ob es einen bestimmten kriti-
schen Wert für die relative Häufigkeit dieser Merkmale beim
einzelnen Patienten gibt, aus dem eine Chromosomenuntersu-
chung indiziert ist.

Als weitere Methode zur Ermittlung eines solchen kritischen
Wertes wurde eine lineare Diskriminanzanalyse nach R.A.
Fisher (Einzelheiten siehe statistische Fachliteratur) durch-
geführt. Die Berechnung erfolgte mittels des statistischen
Programmpaketes STATSYS auf der CDC 3500 am Universitäts-
Rechenzentrum Erlangen-Nürnberg unter Mithilfe von Herrn
Dr. W. Gunselmann (Institut für Medizinische Statistik und
Dokumentation der Universität Erlangen-Nürnberg, Vorstand:
Prof. Dr. L. Horbach).

ERGEBNISSE

Befunde der Patienten mit Chromosomenstörungen

Entsprechend der Reihenfolge der Daten in den Befundtabellen (Anhang) werden die Befunde im einzelnen dargestellt. Dabei sollen zunächst nur die Befunde der Patienten mit Chromosomenstörungen besprochen werden. Die Unterschiede zu den anderen Patientengruppen werden später herausgestellt. Um Wiederholungen in der tabellarischen Darstellung der Befunde zu vermeiden, werden in den Tabellen die Daten der anderen Patientengruppen bereits mit aufgeführt.

Das Alter der Eltern bei der Geburt der Patienten ist in Tabelle 5 dargestellt. Dabei wurden die Daten für die Patienten mit familiären und sporadischen Chromosomenstörungen getrennt angegeben. Bei 4 Patienten mit strukturellen Chromosomenstörungen konnten die Chromosomen der Eltern nicht untersucht werden (in der Tabelle als "familiär?" bezeichnet). Das elterliche Alter bei der Geburt der Patienten mit Chromosomenstörungen zeigte keine Abweichung von den Durchschnittswerten der Gesamtbevölkerung. Zwischen den erblichen und sporadischen Chromosomenstörungen ließ sich kein deutlicher Unterschied im elterlichen Alter bei der Geburt der Patienten feststellen.

Bei der Untersuchung der Stellung der Patienten in der Geschwisterreihe ließen sich keine Besonderheiten erkennen (Tabelle 4).

Tabelle 5 zeigt, wie häufig in den Familien der Patienten Totgeburten, Aborte und weitere Kinder mit Mißbildungen vorkamen. In 2 Fällen mit familiärer Chromosomenstörung hatte jeweils 1 Geschwister mit ähnlichen Mißbildungen und Retardierung die gleiche unbalancierte Chromosomenstörung wie der Patient. Bei einem dieser Fälle war außerdem 1 Geschwister im Alter von 2 Tagen mit multiplen Mißbildungen

gestorben, ohne daß eine Chromosomenuntersuchung vorgenommen werden konnte. In 6 der 31 Familien der Patienten mit Chromosomenstörungen waren Aborte vorgekommen, etwa gleich häufig bei den familiären und sporadischen Chromosomenstörungen.

In Tabelle 6 sind die anamnestischen Angaben über Auffälligkeiten im 1. Trimenon der Schwangerschaft (fiebrhafte Erkrankungen, Medikamente, Röntgenbelastung, Blutungen) zusammengestellt. Diese wurden in der Gruppe der Patienten mit Chromosomenaberrationen bei 3 von 30 Schwangerschaften angegeben.

Die Daten zu Schwangerschaftsdauer und Geburtsgewicht (Tabelle 7) zeigen, daß die Patienten mit Chromosomenstörungen im Durchschnitt termingerecht geboren werden. Das Geburtsgewicht ist vermindert. 10 der 31 Patienten waren Mangelgeborene. Bei 3 dieser 10 Mangelgeborenen lag auch die Geburtslänge unter der 3. Perzentile.

Bezüglich der Geburtslage waren keine Besonderheiten festzustellen: Von 25 der 31 Kinder mit Chromosomenstörungen ist die Geburtslage bekannt. In einem Fall lag eine Steißlage vor, die übrigen Kinder wurden aus Kopflage geboren.

In Tabelle 8 ist angegeben, wieviele Patienten der verschiedenen Altersgruppen zum Zeitpunkt der Untersuchung frei sitzen, frei laufen und zumindest einige Worte sprechen konnten (Patienten ab 1 Jahr). Diese Daten zeigen die schwere Verzögerung der statomotorischen und sprachlichen Entwicklung bei den Patienten mit Chromosomenstörungen. Nur 1 der 10 Patienten unter 3 Jahre konnte laufen, nur die Hälfte frei sitzen. Keiner der 10 Patienten unter 3 Jahre konnte sprechen.

Bei einem Teil der Patienten lagen uns Angaben vor über den Zeitpunkt, zu dem die Kinder erstmals diese statischen und sprachlichen Leistungen zeigten (Tabelle 9). Das so erhaltene

Bild über die statische und sprachliche Entwicklung laßt ebenfalls die deutliche Entwicklungsverzögerung erkennen. Unter Verwendung der anamnestischen Daten ergab sich für den Dentitionsbeginn keine deutliche Verzögerung.

Die Verteilung der Schweregrade des Schwachsinn bei den Patienten über 6 Monate zeigt Tabelle 10. Leichte, mittelschwere und schwere Formen des Schwachsinn waren etwa gleich häufig zu beobachten; sehr schwere geistige Retardierung kam dagegen seltener vor. Die Patientin I, 19 mit partieller Monosomie 15 (p,q prox) hat als einzige der Patienten mit Chromosomenstörungen einen EQ im Normbereich, jedoch waren auch bei dieser Patientin die statische und sprachliche Entwicklung deutlich verzögert. Diese Patientin wurde seit der frühen Säuglingszeit sehr gefördert (Heilgymnastik, logopädische Betreuung, intensive Zuwendung der Eltern), wodurch die Auswirkung der Chromosomenstörung auf die geistige Entwicklung möglicherweise gemildert werden konnte.

Mit dieser einen Ausnahme weisen alle Patienten mit Chromosomenstörungen neben der statischen auch eine geistige Retardierung auf. - Für die Patienten unter 1/2 Jahr war eine sichere Beurteilung des Schweregrades der Retardierung nicht möglich. Aber auch bei diesen ist eine Retardierung anzunehmen (Fehlen oder starke Verminderung der statischen Leistungen bei den Neugeborenen und jungen Säuglingen, fehlender oder stark verminderter Umweltkontakt waren immer zu beobachten, in vielen Fällen mußten die Kinder wegen Trinkschwäche nach der Geburt längere Zeit mit einer Sonde ernährt werden).

In Tabelle 11 ist die Häufigkeit der auffälligen Merkmale zusammengestellt, die bei der klinischen Untersuchung der Patienten gefunden wurde. Diese Befunde wurden nach der Häufigkeit, mit der sie bei den Patienten mit Chromosomenstörungen beobachtet wurden, geordnet (Tabelle 12).

Tabelle 13 gibt einen Überblick über die Häufigkeit innerer Mißbildungen und über die Befunde der Zusatzuntersuchungen,

wobei die Befunde der Röntgenuntersuchungen des Skeletts in Tabelle 14 gesondert dargestellt sind.

Herzfehler wurden bei 8 der 31 Patienten mit Chromosomenstörung nachgewiesen. Es handelt sich um verschiedene Herzfehler (Einzelheiten sind aus den Befundtabellen im Anhang ersichtlich). Bei weiteren 5 Patienten besteht der Verdacht auf einen Herzfehler. Über die Häufigkeit anderer innerer Mißbildungen lassen sich nur beschränkt Aussagen machen, da nicht in allen Fällen die zur Erfassung dieser Mißbildungen notwendigen speziellen Untersuchungen durchgeführt wurden (Röntgendarstellung der Nieren und ableitenden Harnwege, des Magen-Darm-Traktes, Luftencephalogramm). Mißbildungen der Nieren und ableitenden Harnwege wurden bei 5 von 11 Patienten, bei denen eine Röntgenuntersuchung der Nieren gemacht wurde oder bei denen ein Sektionsbefund vorlag, gefunden (Einzelheiten siehe Befundtabellen im Anhang). Mißbildungen im Magen-Darm-Trakt lagen vor bei 1 Patienten (Colon und Coecum mobile), Mißbildungen der inneren Genitalorgane (Uterus bipartitus und Vagina duplex 2x, Uterus bicornis unicollis 1x) bei 3 der 5 verstorbenen und seziierten weiblichen Patienten. Durch Luftencephalographie oder bei der Sektion wurden bei 6 Patienten Hirnmißbildungen festgestellt (Hydrocephalus internus 3 x, Hydrocephalus internus et externus 3x, Hypertrophie des Plexus chorioideus und Encephalocoele je 1x). An weiteren Mißbildungen kamen vor: Omphalocele, Choanalatresie, abnorme Lungenlappung. Zusammengekommen wurden bei insgesamt 15 der 31 Patienten mit Chromosomenstörungen Mißbildungen der inneren Organe sicher festgestellt. Mißbildungen der inneren Organe außer Herzfehler wurden bei 12 Patienten gefunden.

Bei 19 Kindern mit Chromosomenstörungen wurde der Augenhintergrund untersucht. Dabei ergaben sich 5 auffällige Befunde: je 1 Patient mit Aderhaut- und Papillenkolobom, 1 Patient mit Tortuositas vasorum, 1 Patient mit Pigmentanomalie der Papille

und 1 Patient mit Macula- und subretinalen Blutungen (die Augenhintergrundsveränderungen bei den 3 letztgenannten Patienten sind wohl nicht auf die Chromosomenstörung ursächlich zu beziehen).

Bei einem der Patienten mit Chromosomenstörungen ist Blindheit anzunehmen (ausgeprägter Mikrophthalmus), bei einem weiteren Patienten war keine normale Reaktion auf optische Reize vorhanden. 4 Patienten waren schwerhörig.

Krampfanfälle waren bei 4 Patienten mit Chromosomenstörungen aufgetreten: bei 2 Patienten entwickelte sich im Kleinkindalter ein Anfallsleiden mit großen Anfällen, 1 Patient hatte nur einmal einen großen Krampfanfall, bei 1 Patienten mit petit-mal-Anfallsleiden wurden die ersten Anfälle im Alter von 5 Monaten beobachtet.

Von 19 Patienten mit Chromosomenstörungen liegen EEG-Befunde vor. In einem Fall wurden neben Allgemeinveränderungen auch Zeichen einer gesteigerten Anfallsbereitschaft festgestellt, in 4 Fällen nur Allgemeinveränderungen, in weiteren 4 Fällen Krampfpotentiale.

11 von 22 Patienten mit Chromosomenstörungen hatten im Echoencephalogramm eine Erweiterung des 3. Ventrikels von mindestens 8 mm.

Die quantitative Immunglobulinbestimmung bei 16 Patienten mit Chromosomenstörungen ließ in 5 Fällen eine deutliche Verminderung von IgA, in einem Fall auch von IgM, unter die altersnormalen Werte erkennen.

20 der 51 Patienten zeigten eine oder mehrere röntgenologisch nachweisbare Anomalien des Skelettsystems (Tabelle 14). Die Skelettveränderungen sind bei den Patienten mit Chromosomenstörungen über das gesamte Skelettsystem verteilt. An

den verschiedenen Skelettregionen kommen verschiedenste Abweichungen vom Normalen vor. Eine Retardierung des Knochenalters war häufig vorhanden (bei 9 von 16 Patienten).

11 der 31 Patienten mit Chromosomenstörung sind unserer Kenntnis nach bisher verstorben (Tabelle 15). 4 davon starben bereits im 1. Lebensmonat. Ein Kind mit Ringchromosom 21 (Fall I, 25) starb an einer Leukämie, ein Säugling mit schweren Nierenmißbildungen (Fall I, 8) starb im Nierenversagen, bei 4 Patienten (I, 10; I, 11; I, 20; I, 21) ist die Todesursache nicht bekannt. Bei den übrigen verstorbenen Patienten lagen schwere Mißbildungen der inneren Organe vor.

Die bisher dargestellten Befunde lassen folgende allgemeine für die Gruppe der Patienten mit Chromosomenstörungen charakteristische Eigenschaften erkennen:

Alle Patienten weisen eine statische und (bis auf eine Ausnahme) geistige Retardierung auf. Bei allen Patienten sind multiple morphologische Anomalien zu finden. Diese sind beim einzelnen Patienten auf verschiedene Körperregionen verteilt. Bei dem größeren Teil der Patienten sind Mißbildungen mit Krankheitswert wie Lippen-, Kiefer- oder Gaumenspalten, Mißbildungen der inneren Organe vorhanden.

Die Längen- und Gewichtsentwicklung sowie der Kopfumfang liegen meist weit unter dem Altersdurchschnitt. Eine Retardierung des Knochenalters ist häufig zu finden. Der Muskeltonus ist bei den meisten Patienten vermindert. Bei den männlichen Patienten liegt häufig ein Kryptorchismus vor.

Vergleich der Befunde der verschiedenen Patientengruppen

Wie charakteristisch ein Einzelmerkmal für eine bestimmte Patientengruppe ist, kann danach beurteilt werden, ob es in dieser Patientengruppe im Vergleich zu anderen Patientengruppen besonders häufig vorkommt.

Die Häufigkeit der einzelnen in Tabelle 11 aufgeführten Merkmale und der Merkmale herzförmiger und Mangelgeburt in der Gruppe der Patienten mit Chromosomenstörungen wurde verglichen mit der Häufigkeit dieser Merkmale in der zufällig ausgewählten Stichprobe von Klinikpatienten. Im Vierfeldertest ergaben sich dabei signifikante Unterschiede * für die in Tabelle 10 angegebenen Merkmale.

Zwischen der Gruppe der Patienten mit multiplen morphologischen Anomalien und statischen - geistiger Retardierung ohne Chromosomenstörung und der Gruppe der Patienten mit Chromosomenstörung ließ sich für die in Tabelle 11 aufgeführten Merkmale sowie herzförmiger und Mangelgeburt ein Unterschied in der Häufigkeit statistisch nicht sichern.

Bezüglich des Alters der Eltern bei der Geburt der Patienten (Tabelle 3), der Stellung der Patienten in der Geschwisterreihe (Tabelle 4), der Geburtslage, der statischen Entwicklung (Tabelle 8 und 9), der Häufigkeit von Krampfanfällen und einiger Befunde von Zusatzuntersuchungen (Tabelle 13) sowie der Häufigkeit von inneren Missbildungen bestanden keine Unterschiede. Das Geburtsgewicht war in der Gruppe der Patienten mit multiplen morphologischen Anomalien und statisch - geistiger Retardierung ohne Chromosomenstörung im Durchschnitt etwas höher (Tabelle 1), die Sprachentwicklung weniger stark verzögert (Tabelle 8 und 9), die geistige Retardierung weniger stark ausgeprägt (Tabelle 10), eine Retardierung im Knochenalter seltener (Tabelle 14), die Aborthäufigkeit in den Familien geringer (Tabelle 5), Störungen im 1. Schwangerschaftsdrittel häufiger (Tabelle 6) als bei den Patienten mit Chromosomenstörung. Statistisch ließen sich jedoch auch diese Unterschiede nicht sichern.

* Die etwa 60 Einzelteste wurden auf dem 0,1 % - Niveau durchgeführt, so daß die Gesamtirrtumswahrscheinlichkeit unter 6 % liegt.

Nachdem durch Vergleich mit der Stichprobe aus der Klinikpopulation eine Reihe von Merkmalen (Tabelle 10) herausgestellt werden konnte, die für die Gruppe der Patienten mit Chromosomenstörungen charakteristisch sind, war es sinnvoll, zu untersuchen, ob hinsichtlich der Anzahl dieser Merkmale beim einzelnen Patienten zwischen der Gruppe der Patienten mit Chromosomenstörung (Gruppe I) und der Gruppe der Patienten mit multiplen morphologischen Anomalien und statisch-geistiger Retardierung ohne Chromosomenstörung (Gruppe II) ein Unterschied besteht.

Dabei wurden folgende Merkmale nicht berücksichtigt: Strabismus, da dieses Merkmal bei Patienten unter 1/2 Jahr nicht sicher zu beurteilen ist, auch das Merkmal Kryptorchismus wurde zunächst nicht berücksichtigt, da es geschlechtsabhängig ist.

Für jeden einzelnen Patienten wurde ausgezählt, wieviele der in Tabelle 10 (außer Strabismus und Kryptorchismus) angegebenen Merkmale bei ihm gefunden wurden. Fehlende Angaben wurden wie Nichtvorhandensein des Merkmals bewertet (nur bei 1 Patienten der Gruppe II fehlten Angaben zu einem Merkmal, während dies bei 5 Patienten der Gruppe I der Fall war). Es zeigte sich, daß bei 29 der 51 Patienten mit Chromosomenstörung 6 und mehr dieser 17 Merkmale vorhanden waren. Dagegen waren nur bei 18 der 52 Patienten mit multiplen Dysmorphien und statisch-geistiger Retardierung ohne Chromosomenstörung 6 und mehr dieser Merkmale zu finden. Diese Ergebnisse sind in Abbildung 2 dargestellt. Der Unterschied zwischen den Patienten der Gruppe I und II hinsichtlich der Anzahl der beim einzelnen Patienten vorhandenen Merkmale war nach dem Median-Test signifikant (Irrtumswahrscheinlichkeit $\alpha \leq 1\%$).

Damit auch das Merkmal Kryptorchismus mit berücksichtigt werden konnte, wurde der Quotient: $\frac{\text{Anzahl vorhandener Merkmale}}{\text{Anzahl untersuchter Merkmale}}$

eingeführt. Die Gesamtzahl der berücksichtigten Merkmale betrug somit bei den Mädchen 17 und bei den Jungen 18. Die Quotienten, die für jeden einzelnen Patienten errechnet wurden, sind in Tabelle 17, geordnet nach der Größe für die beiden Patientengruppen angegeben. Setzt man als Grenzwert für den Quotienten 0,33 fest, so liegen 2 der 31 Patienten mit Chromosomenstörungen und 15 der 32 Patienten mit multiplen morphologischen Anomalien und statisch - geistiger Retardierung ohne Chromosomenstörung unter diesem Wert.*

Die Merkmale (Tabelle 16, außer Strabismus): Mangelgeburt, Körpergröße unter 3. Percentile, Gewicht unter 3. Percentile, Kopfumfang unter 3. Percentile, flacher Hinterkopf, breite Nasenwurzel, kleines Kinn, Lippen-Kiefer- und/oder Gaumenspalte, nach außen ansteigende Lidachsen, tiefsitzende Ohren, dysplastische Ohren, kurzer Hals, Synechylinie, Klinodaktylie der Kleinfinger, Fußdeformitäten (außer Sichelfuß), Zehenstellungsanomalien, Muskelhypotonie, Kryptorchismus konnten daher geeignet sein, unter Patienten mit statisch - geistiger Retardierung und multiplen morphologischen Anomalien die Patienten mit autosomaler Chromosomenstörung herauszufinden, indem die Indikation zur Chromosomenanalyse dann gestellt wird, wenn bei einem Patienten mit statisch - geistiger Retardierung mehr als ein Drittel dieser Merkmale vorliegen.

Zum Methodenvergleich wurde eine lineare Diskriminanzanalyse durchgeführt, obwohl die Voraussetzungen über die Verteilungen der berücksichtigten Variablen (Multinormalität und Gleichheit der Kovarianzmatrizen in beiden Gruppen) nicht erfüllt waren. Dieses statistische Verfahren versucht, eine lineare Funktion der Variablenwerte ("Diskriminanzfunktion") so zu bestimmen, daß die Varianz der Diskriminanzfunktionswerte innerhalb der beiden zu trennenden Gruppen im Vergleich zu den zwischen den Gruppen möglichst klein wird. Die großen-

* Bei 5 der 32 Patienten der Gruppe II beträgt der Quotient 0,33.

maßige Anordnung der berechneten Werte in beiden Gruppen erlaubt dann ebenso wie bei der oben beschriebenen Bildung relativer Häufigkeiten die Festlegung eines kritischen Wertes, für den folgende Regel sinnvoll erscheint: übertrifft der Diskriminanzfunktionswert eines Patienten die kritische Marke, so wird bei diesem Patienten eine Chromosomenanalyse veranlaßt.

Für die praktische Berechnung mit den vorliegenden Daten wurden die wenigen fehlenden Werte durch die Mittelwerte der beobachteten Ausprägungen der entsprechenden Merkmale in den jeweiligen Gruppen ersetzt. Die Überlappung der Bereiche der Diskriminanzfunktionswerte beider Gruppen entsprach der bei der oben dargestellten Methode mit Quotientenbildung. Die Anwendung beider Methoden auf neue Fälle und für größere Fallzahlen muß erweisen, welche Prozedur die stabilere, das heißt von den Zufälligkeiten der untersuchten Stichproben unabhängigere ist.

DISKUSSION

Seit Lejeune 1959 (25) entdeckte, daß das Krankheitsbild des Mongolismus mit der Überzahl eines Chromosoms einhergeht, hat sich die klinische Zytogenetik zu einem speziellen Fachgebiet (10) entwickelt, das insbesondere für die Pädiatrie große Bedeutung hat. Es konnte eine Reihe von Mißbildungs-syndromen abgegrenzt werden, denen Chromosomenstörungen zugrunde liegen. Die bekanntesten autosomalen Chromosomenaberrationssyndrome sind neben der Trisomie 21 die Trisomie 18 (Edwards-Syndrom), die Trisomie 13 (Patau-Syndrom) und die partielle Monosomie des kurzen Armes eines Chromosoms 5 (Katzenschrei-Syndrom). Darüber hinaus wurde eine größere Zahl von weiteren autosomalen Chromosomenaberrationen bisher beschrieben (Literaturübersicht bei 3, 24). In der Literatur wird in ständig zunehmender Zahl über Patienten mit neuen, bisher nicht bekannten Chromosomenaberrationen berichtet.

Aus mehreren Gründen ist es wichtig, das Vorliegen einer autosomalen Chromosomenstörung bei einem Patienten zu erkennen: Dem Patienten können weitere, möglicherweise belastende Untersuchungen erspart werden. Die Prognose für seine weitere Entwicklung läßt sich besser beurteilen. Die Aufdeckung einer Chromosomenstörung bei einem Patienten ermöglicht die genauere Abschätzung des Wiederholungsrisikos und den Einsatz präventiver Maßnahmen bei weiteren Schwangerschaften (pränatale Chromosomenuntersuchung). Nicht selten sind strukturelle Chromosomenstörungen familiär. So wurde bei 11 unserer 30 Patienten mit strukturellen Chromosomenstörungen eine balancierte Chromosomenstörung bei einem der Eltern gefunden. Damit diese Familien mit hohem genetischen Risiko beraten werden können, bevor weitere Kinder mit Chromosomenstörungen geboren werden, ist es wichtig, daß die Patienten mit autosomalen Chromosomenstörungen möglichst frühzeitig erfaßt werden. Dies ist umso mehr geboten, als die Lebenserwartung dieser Patienten oft stark vermindert ist.

Die Symptomenmuster bei den Trisomien 21, 18 und 13 sind so bekannt und charakteristisch, daß sich bei diesen Patienten der Verdacht auf das Vorliegen eines chromosomal verursachten Mißbildungssyndroms in der Regel aus dem für diese Störungen typischen klinischen Bild ergibt. Abgesehen vom Katzen-schrei-Syndrom, bei dem das hohe Wimmern bei jungen Säuglingen auf das Vorliegen dieser Störung hinweisen kann (dies charakteristische Symptom verliert sich allerdings manchmal mit zunehmendem Alter der Patienten), sind dagegen die Symptomenmuster der übrigen autosomalen Chromosomenaberrationssyndrome weniger bekannt und auch meist klinisch weniger gut abgrenzbar.

An welchen Kriterien soll man sich orientieren, um auch diese Patienten und Patienten mit neuen, bisher nicht bekannten Chromosomenstörungen herauszufinden?

Chromosomenuntersuchungen bei größeren Patientenserien (Tabelle 18) haben gezeigt, daß derartige Chromosomenstörungen am häufigsten (zu etwa 10 %) bei Patienten mit statisch - geistiger Retardierung und mehreren morphologischen Anomalien unbekannter Ätiologie zu finden waren (35, 8, 4, 9, 28). Der Anteil derartiger Patienten lag viel geringer in den Serien, in denen andere Kriterien (nur geistige Retardierung (etwa 1 %) oder nur Mißbildungen) bei der Auswahl der Patienten angewandt wurden (36, 1, 26, 5, 10, 7, 6).

Um einen Überblick zu geben, mit welcher Häufigkeit diese Chromosomenstörungen in der Durchschnittsbevölkerung gefunden werden, sind am Beginn der Tabelle die Ergebnisse der Chromosomenuntersuchungen bei konsekutiv erfaßten lebendgeborenen Neugeborenen angegeben (nach der Zusammenstellung von Hamerton (19), ergänzt durch neue Daten von Nielsen (27)).

Auch zusammenfassende Darstellungen (21, 29) über die Symptomenmuster bei verschiedenen speziellen autosomalen Chromosomenaberrationen haben gezeigt, daß das klinische Bild bei diesen Patienten ganz allgemein gekennzeichnet ist durch statisch -

geistige Retardierung und multiple morphologische Anomalien (insbesondere im Bereich des Hirn- und Gesichtsschädels und der Extremitäten), wobei häufig Mißbildungen der inneren Organe (Gehirn, Herz, Nieren) zu finden sind.

Es gab unseres Wissens bisher keine vergleichenden Untersuchungen darüber, ob sich die Patienten mit multiplen Dysmorphien und statischen - geistiger Retardierung, bei denen die Chromosomenanalyse einen normalen Befund ergab, in ihrem Merkmalsbild von den Patienten mit pathologischem Chromosomenbefund unterscheiden. Wenn sich ein Unterschied in der Symptomatik aufgedeckt werden konnte, ließe sich die Indikation zur Chromosomenanalyse weiter eingengen. Die Voraussetzung für eine derartige Untersuchung ist die einheitliche Erfassung einer großen Zahl von Merkmalen bei größeren Gruppen entsprechender Patienten. Diese Voraussetzung war für unsere Untersuchung gegeben.

Dabei hat sich bezüglich der Häufigkeit einzelner Merkmale kein signifikanter Unterschied zwischen der Gruppe der Patienten mit Chromosomenstörungen und der Gruppe der Patienten mit multiplen Dysmorphien und geistiger Retardierung ohne Chromosomenstörung erkennen lassen.

Daraufhin wurde geprüft, ob sich beim Vergleich der Merkmalsmuster, also unter Berücksichtigung der Kombination einzelner Merkmale, ein Unterschied erkennen läßt. Es erschien sinnvoll, für diesen Vergleich diejenigen Merkmale auszuwählen, die bei den Patienten mit Chromosomenstörungen signifikant häufiger als bei der zufällig ausgewählten Stichprobe von Klinikpatienten vorkamen: Mangelgeburt, Körpergröße unter 5. Perzentile, Gewicht unter 5. Perzentile, Kopfumfang unter 5. Perzentile, flacher Hinterkopf, breite Nasenwurzel, kleines Kinn, Lippen-, Kiefer- und/oder Gaumenspalte, nach außen ansteigende Lidachsen, Strabismus, tiefsitzende Ohren, dysplastische Ohren, kurzer Hals, Syndaktylie, Klinoaktylie des Kleinfingers, Fußdeformitäten (ohne

Sieheifall), Zehensteifungsanomalien, Muskelpotonic, bei den männlichen Patienten Kryptorchismus. Das Merkmal Strabismus wurde nicht mitberücksichtigt, da es erst ab dem Alter von 7 Monaten sicher zu beurteilen ist. Es zeigte sich, daß zwischen der Gruppe der Patienten mit Chromosomenstörungen und der Gruppe der Patienten mit statisch - geistiger Retardierung und multiplen Dysmorphien ein signifikanter Unterschied bestand hinsichtlich der bei den einzelnen Patienten zu findenden Anzahl dieser Merkmale.

Die Indikation zur Chromosomenanalyse war bei allen Patienten gestellt worden, weil bei ihnen multiple morphologische Anomalien und statisch - geistige Retardierung vorlagen. Unter Anwendung der Kriterien: statisch - geistige Retardierung und Vorhandensein von mehr als einem Drittel der obengenannten Merkmale (außer Strabismus) war bei 15^{*} der 32 Patienten, bei denen die Chromosomenanalyse einen normalen Befund ergab, eine Chromosomenuntersuchung gar nicht veranlaßt worden. Bis auf 2 Patienten waren alle Patienten mit Chromosomenstörungen erfaßt worden. Diese Kriterien könnten daher geeignet sein, die Indikation zur Chromosomenanalyse einzuzengen und Patienten mit weniger bekannten oder bisher unbekannten autosomalen Chromosomenaberrationen zu erfassen.

Das Kriterium multiple morphologische Anomalien, das bisher für die Entscheidung, ob eine Chromosomenanalyse veranlaßt werden soll, angewandt wurde, ist sehr weit gefaßt. Außerdem ist nicht exakt definiert, welche Abweichungen von der normalen Form einzelner Körperregionen als Anomalie einzustufen sind. Das von uns vorgeschlagene Verfahren hat den Vorteil, daß dieses weit gefaßte und schlecht definierte Kriterium ersetzt wird durch eine begrenzte Zahl bestimmter Merkmale. Die Erfassung dieser Merkmale ist einfach, aufwendige Zusatzuntersuchungen sind nicht erforderlich. Die Beurteilung der Merkmale: flacher Hinterkopf, breite Nasenwurzel, kleines Kinn, nach außen ansteigende Lidachsen, kurzer Hals mag bei

* siehe Fußnote S. 27

Schwacher Merkmalsausprägung im Einzelfall schwierig sein. Die übrigen Merkmale sind jedoch ausreichend gut abgegrenzt, sodass eine Entscheidung darüber, ob diese Merkmale vorliegen, unabhängig vom subjektiven Urteil des Untersuchers getroffen werden kann.

Aus diesen Gründen könnte die Methode auch geeignet sein, um damit im Sinne eines Screening-Verfahrens aus größeren Patientengruppen, etwa in Heimen für geistig behinderte Kinder, Patienten mit weniger bekannten Chromosomenaberrations-syndromen oder bisher unbekannten autosomalen Chromosomen-störungen herauszufinden.

Liegen bei einem Patienten einzelne besonders ins Auge fallende Merkmale wie LKG-Spalte, schräge Lidachsen, Ohrmuschel-
dysplasien, Fußdeformitäten, Zehenstellungsanomalien vor, sollte stets sorgfältig nach weiteren auf eine Chromosomenstörung verdächtigen Merkmalen gesucht werden.

Bevor die obengenannten Kriterien bei der Indikationsstellung zur Chromosomenanalyse angewandt werden können, muß geprüft werden, ob sich die in der vorliegenden Untersuchung gefundenen Ergebnisse bei weiteren Patienten bestätigen lassen.

ZUSAMMENFASSUNG

Die anamnestischen und klinischen Befunde von 31 Patienten mit unbalancierten autosomalen Chromosomenstörungen (außer Trisomie 13, 18 und 21), die im Zeitraum von 1966 bis September 1975 in der Universitäts-Kinderklinik Erlangen untersucht werden konnten, werden dargestellt.

Bei diesen Patienten kamen folgende 19 Merkmale signifikant häufiger vor als bei einer Vergleichsgruppe von 100 zufällig ausgewählten Klinikpatienten:

als anamnestisches Merkmal: Mangelgeburt; als klinische Merkmale bei der Untersuchung der Patienten: Körpergröße unter 3. Percentile, Körpergewicht unter 3. Percentile, Kopfumfang unter 3. Percentile, flacher Hinterkopf, breite Nasenwurzel, kleines Kinn, Lippen- Kiefer- und/oder Gaumenspalte, nach außen ansteigende Lidachsen, Strabismus, tiefsitzende Ohren, dysplastische Ohren, kurzer Hals, Syndactylinie, Klinodaktylie des Kleinfingers, Fußdeformitäten (außer Sichelfuß), Zehenstellungsanomalien, Muskelnhypotonie, bei den männlichen Patienten Kryptorchismus.

Damit konnte auch für solche autosomalen Chromosomenaberrationen ein charakteristisches Muster einfach zu erfassender Merkmale herausgestellt werden, bei denen sich nicht - wie bei den Trisomien 13, 18 und 21 - bereits aus dem bekannten typischen klinischen Bild die Indikation zur Chromosomenanalyse ergibt.

Die Anzahl der obengenannten Merkmale beim einzelnen Patienten war signifikant größer bei den Patienten mit autosomalen Chromosomenstörungen als bei Patienten mit statisch - geistiger Retardierung und multiplen Dysmorphien unbekannter Ätiologie.

Unter Anwendung der Kriterien: statisch - geistige Retardierung und Vorhandensein von mehr als einem Drittel dieser Merkmale

(außer Strabismus, da dieses Merkmal erst ab dem 2. Lebenshalbjahr sicher zu beurteilen ist) waren bis auf 2 Ausnahmen alle 51 Patienten mit Chromosomenstörungen erkannt worden; dagegen hätte bei 15* der 52 retardierten Patienten mit multiplen Dysmorphien auf die Chromosomenanalyse verzichtet werden können.

Diese Methode könnte daher geeignet sein, die bisher angewandten Kriterien für die Indikation zur Chromosomenanalyse (statischen - geistige Retardierung und multiple morphologische Anomalien unbekannter Ätiologie) einzuengen und Patienten mit seltenen und bisher unbekannten autosomalen Chromosomenaberrationen gezielter herauszufinden.

* Hierbei wurden die 3 Patienten nicht berücksichtigt, bei denen genau ein Drittel der Merkmale vorhanden war. Bei Einfluß auch dieser Patienten hätte bei 16 der 52 Patienten mit multiplen Dysmorphien und statisch-geistiger Retardierung unklarer Ursache auf die Chromosomenanalyse verzichtet werden können.

Chromosomenstörung

Patientenzahl

Trisomie 21	insgesamt	107
	davon:	
	freie Trisomie 21	110
	Translokation D/G	1
	G/G	2
	Mosaik (normal/Tris.21)	10
	sonstige:	
	47, XX,+21/47,XX,+mar	1
	47, XX,+21/45,X0	1
	46, XX,+18,+21	1
Trisomie 18	freie Trisomie 18	1
Trisomie 15	insgesamt	2
	davon:	
	freie Trisomie 15	2
	Mosaik (normal/Tris.15)	1
Trisomie 9 Mosaik		1
Trisomie 10 Mosaik		1
Strukturelle Aberrationen		31
		180

Tabelle 1: Zusammenstellung der Patienten aus der Universitäts-Kinderklinik Erlangen mit nachgewiesenen unbalancierten autosomalen Chromosomenstörungen (1900 - September 1975)

Pat.-Nr.	Chromosomenbefundung (vereinfachte Darst.)	Karyotyp (Pariser Nomenklatur) (2n)
1.	21 +	46,XX,-22,der(22),t(3;22)(q20;p11)mat
2.	4 p -	46,XX,-4,-13,der(4;13),t(4;13)+inv(4)
3.	4 q -	46,XX,del(4)(p1)
4.	4 p +	46,XX,-22,der(22),t(4;22)(p14;p11)pat
5.	5 p -	46,XX,der(5)(p15)
6.	5 p -	46,XX,del(5)(p15)
7.	5 p +	46,XX,inv(5)(p15;100)pat+dup(5)(p15)
8.	7 q -	46,XX,del(7)(q32)
9.	7 p +	46,XY,dup(7)(p21;22)
10.	8 q - ?	46,XX,del(8)(q22?)
11.	+ 9(p,q prox)	47,XX,+uer(9),t(4;9)(p15;q21)mat
12.	Mosaik + 9	46,XX/47,XX,+9 (96% : 4%)
13.	10 p +	46,XY,-7,der(7),t(7;10)(q20;p14)pat
14.	11(p,q prox)+	46,X,-Y,-11,t(11;Y)(q15;q11)
15.	15 q -	46,XY,del(15)(q22)
16.	15 r	46,XX,r(15)(p11;q32)
17.	+ 15(p,q prox)	47,XX,+uer(15),t(15;10)(q14;q24)mat
18.	15 q +	46,XX,-6,-10,uer(6;10),t(6;10;15) (p20;q11;q14)pat
19.	- 15(p,q prox)	47,XX,-5,-15,uer(5),t(5;15)(p27;q15)pat
20.	17 q + ?	46,XY,-22,der(22),t(17;22)(?;?)pat
21.	18 p -	46,XY,del(18)(p11)
22.	18 q -	46,XY,del(18)(q21)
23.	18 r	46,XY,r(18)(p11;q20)
24.	18 q +	46,XX,-2,uer(2),t(2;18)(q37;q21)mat
25.	21 r	46,XX,r(21)(p11;q22)
26.	mar 18	46,XY,-18,der(18),t(18;?)
27.	mar 15	46,XY,-15,uer(15),t(15;?)(q34;?)
28.	mar 7	46,XX,-7,der(7),t(7;?)(q30;?)
29.	Mosaik + mar	46,XY/47,XX,+mar (50% : 50%)
30.	+ mar	47,XX,+mar
31.	+ C (p,q prox)	47,XX,der(C)+

Erläuterungen der Abkürzungen:

1-22:	Chromosomennummer
p-, q-:	Deletion am kurzen bzw. langen Chromosomenarm
p+, q+:	Trisomie von Chromosomenabschnitten des kurzen bzw. langen Chromosomenarmes
prox:	centromernaher Abschnitt
r:	Ringchromosom
mar:	Markerchromosom, Zuordnung nicht möglich

Tabelle 2: Zusammenstellung der Chromosomenbefunde (Pat.gruppe I)
(erhoben von Frau Dr. Schwanitz, Institut für Humangenetik und Anthropologie der Universität Erlangen-Nürnberg,
Direktor: Prof. Dr. G. Koch)
(Diese Fälle wurden zu einem Teil bereits publiziert
(12, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 32, 33, 34, 38))

Patientengruppe		n	Mütter	Väter
I	Gesamt	51	26,5	29,0
	familiar	11	27,3	29,6
	familiar?	4	24,8	25,5
	sporadisch	16	26,4	29,4
II		32	25,2	29,3
III		98*	27,1	30,3

Tabelle 3: Alter der Eltern bei der Geburt der Patienten
(Mittelwert)

* bei 2 Patienten lagen keine Angaben vor

Patienten- gruppe	n	1(1)	1(2)	1(3)	1(4)	2(2)	2(3)	3(3)	3(4)	4(4)	4(5)	4(6)	5(5)	5(6)	6(6)	7(7)	8(8)
I Gesamt	51	14	1	1		5	3	5	1		1						
familiar	11	4	1			3	1	2									
familiar?	4	4															
sporadisch	16	6		1		2	2	3	1		1						
II	21*	10	2	2		9	2	3		1				1	1		
III	99*	20	4		1	37	3	9		5		1	3	1	2	1	2

1
2
1
1

Tabelle 4: Stellung der Patienten in der Geschwisterreihe

* in 1 Fall lagen keine Angaben vor

Patienten- gruppe	n	Gesamtzahl d. Graviditäten	Kinden mit Missbildungen (ohne Pat.)	Totgeb.	Aborte/Zahl u. Gravidit.	Anteil der Familien mit Aborten
I Gesamt	31	68	3	0	6/68	6/51
familiär	11	25	3	0	2/25	2/11
familiär?	4	5	0	0	1/5	1/4
sporadisch	16	40	0	0	3/40	3/10
II	31*	72	3		5/72	2/31

Tabelle 5: Häufigkeit von Totgeburten, Aborten und weiteren Kindern mit Missbildungen in den Familien der Patienten

* in 1 Fall lagen keine Angaben vor

Patienten- gruppe	Erkrankungen	Medikamente	Röntgenunters.	Blutungen	"gestörten" Schwangerschaften insgesamt
I	2 (grippale Inf. mit Fieber)	2 (Gestanon 1, Gripptetabl. 1)	0	2	3 (von 50*)
II	4 (grippale Inf. mit Fieber)	4 (Fluprim 1, Togal 1, Geloniða 1, Microgynon 1)	4 (Lunge 2, Mamma 1, Zähne 1)	4	3 (von 31*)

Tabelle b: Auffälligkeiten im 1. Schwangerschaftsdrittel

* in 1 Fall lagen keine Angaben vor

Patienten- gruppe	n	+ Tage nach - Tage vor ET (Mittelwert)	Geb.gewicht (Mittelwert)	Frühgeborene (Geb. vor 38. Woche, Gewicht über 10.Perc.)	Früh-Mangel- Geborene (Geb. vor 38. Woche, Gewicht unter 10.Perc.)	Mangelgeborene (geb. nach 38. Woche, Gewicht unter 10.Perc.)	Mangelgeborene mit Geb.länge unter 10.Perc.
I	31	+ 0,10	2701 g	2	1	10	3
II	32	- 5,75	2971 g	6	2	8	0
III	9/*	- 5,25	3215 g	14	0	6	0
							1
							5
							1

Tabelle /: Schwangerschaftsdauer und Geburtsgewicht

* bei 5 Patienten la-zen keine Angaben vor.

Alter zur Zeit der Untersuchung	Patienten- gruppe	Anzahl der Patienten	Sitzen		Laufen		Sprechen	
			ja	nein	ja	nein	ja	nein
1 J.- unter 2 J.	I	5	2	3	0	5	0	5
	II	7	3	4	0	7	2	5
2 J.- unter 3 J.	I	5	3	2	1	4	0	5
	II	3	3	0	1	2	2	1
3 J.- unter 4 J.	I	2	2	0	0	2	1	1
	II	1	1	0	0	1	1	0
4 J.- unter 5 J.	I	2	2	0	1	1	2	0
	II	1	1	0	1	0	0	1
5 J.- unter 6 J.	I	1	1	0	1	0	0	1
	II	2	2	0	2	0	1	1
über 6 J.	I	3	3	0	3	0	3	0
	II	3	3	0	3	0	3	0

Tabelle c: Statomotorische und sprachliche Leistungen zum Zeitpunkt der Untersuchung bei Patienten verschiedener Altersstufen

Patienten- gruppe	Sitzen	Laufen	erste Worte	Dentitionsbeginn
I	18,3 Mon. (13 Pat.)	32 Mon. (10 Pat.)	34,4 Mon. (7 Pat.)	7,8 Mon. (10 Pat.)
II	18,6 Mon. (5 Pat.)	29,4 Mon. (7 Pat.)	16 Mon. (7 Pat.)	8,5 Mon. (13 Pat.)

Tabelle 9: Anamnestische Daten zur Entwicklungsanamnese
(durchschnittliches Alter, in dem erstmals diese
statischen und sprachlichen Leistungen beobach-
tet wurden und die Dentition begann; in Klammern
ist angegeben, von wieviel Patienten jeweils
anamnestische Angaben vorlagen)

Patienten- gruppe	n	Geistig normal	Schweregrad der geistigen Retardierung			
			leicht +	mittelschwer ++	schwer +++	sehr schwer ++++
I	22	1	0	6	7	2
II	19	0	14	4	4	0

Tabelle 10: Schweregrad der geistigen Retardierung
(Patienten ab 7 Monate)

	Patientengruppe		
	I	II	III
Körpergröße unter 3. Perzentile	17	10	14/98
Körpergewicht unter 3. Perzentile	17	14	16/98
Kopfumfang unter 3. Perzentile	18	13	19/98
Ausladender Hinterkopf	6	4	9
Flacher Hinterkopf	10	8	8
Vorspringende Nasenwurzel	10	14	13
Flache Nasenwurzel	13	9	22
Breite Nasenwurzel	28	25	40
Vorspringendes Kinn	4	0	3
Kleines Kinn	20	15	21
Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalte	9	6	5
Hoher Gaumen (bei Pat. ohne L-K-G)	10/22	17/26	19/95
Nach außen ansteigende Lidachsen	13	8	10
Nach außen abfallende Lidachsen	5	4	1
Enge Lidspalten	5	3	1
Epikanthus	12	12	26
Mikro-, Anophthalmie	1	0	0
Katarakt	0/29	1/31	0
Iriskolobom	0	0	0
Brushfield'sche Flecken	5/29	5/31	5
Strabismus	10/22	7/19	2/75
Nystagmus	2/22	1/19	0
Tiefsitzende Ohren	16	10	1
Abstehende Ohren	4	7	7
Dysplastische Ohren	19	14	6
Gehörgang eng oder atretisch	4	5	0
Präaurikulare Grübchen, Anhängsel	4	4	2
Großer Mund	5	2	2
Kleiner Mund	3	1	2
Zahnstellungsanomalien	9/22	9/14	9/65
Kurzer Hals	19/50	13	4
Überschüssige Nackenhaut	4/27	3	0
Thoraxdeformität	3/50	4/31	0
Rectusdiastase	2/28	1	0
Nabelbruch	6/50	6/50	7
Leistenbruch	4/30	4	2
Kryptorchismus	9/12	3/16	1/59
Hypospadie	4/12	0/16	0/59
Sonstige Anomalien des äußeren Geni- tale	3	2	2

Tabelle 11: Häufigkeit klinischer Merkmale

1. Teil

(Anzahl der Patienten in den einzelnen Gruppen:
I: 31; II: 32; III: 100; wenn ein Merkmal nicht bei
allen Patienten der Gruppe beurteilt werden konnte,
wurde die Zahl der darauf untersuchten Patienten
angegeben).

Kurze und breite Hände	11/30	15/31	9
Typische Vierfingerfurchen	5/30	8/31	5
Sydneylinie	8/30	5/31	4
Atypische Vierfingerfurchen	4/30	6/31	2
Syndaktylie	5	4	2
Polydaktylie	1	1	0
Lange, schmale Finger	5/30	2	0
Fingerkontrakturen	2/29	0	1
Dysplastische Finger- und/oder Zehen- nägel	4/30	5	0
Klinodaktylie des Kleinfingers	18/30	11	14
Kurzer Kleinfinger	17	17	34
Sonstige Phalangenhypoplasie	4	1	0
Nur 1 Beugefurchen am Kleinfinger	2/29	1	0
Weiter Abstand zwischen 1. und 2. Zehe	4/28	4	0
Plantarfurchen	5/25	9	11
Fußdeformitäten (außer Sichelfuß)	15	12	6
Zehenstellungsanomalien	15/29	5	17
Muskelhypotonie	21/28	19	5
Muskelhypertonie	1/28	0	4

Tabelle 11: Häufigkeit klinischer Merkmale
2. Teil

Bei der Hälfte und mehr
der Patienten

breite Nasenwurzel
Muskelhypotonie
Kryptorchismus (bei ♂)
kleines Kinn
kurzer Hals
dysplastische Ohren
Klinodaktylie des Kleinfingers
kurzer Kleinfinger
tiefsitzende Ohren
Zehenstellungsanomalien
Größe unter der 3. Percentile
Gewicht unter der 3. Percentile
Kopfumfang unter d. 3. Percentile

Bei 1/4 bis weniger als der
Hälfte der Patienten

Strabismus
hoher Gaumen
Fußdeformitäten
flache Nasenwurzel
nach außen ansteig. Lidachsen
Zahnstellungsanomalien
Epikanthus
Hypospadie (bei ♂)
flacher Hinterkopf
vorspringende Nasenwurzel
Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalte
Sydneylinie

Bei 1/10 bis weniger als 1/4
der Patienten

Plantarfurche
Nabelbruch
ausladender Hinterkopf
kurze, breite Hände
nach außen abfall. Lidachsen
enge Lidspalten
überschüssige Nackenhaut
weiter Abstand zw. 1. u. 2. Zehe
abstehende Ohren
enger od. atret. Gehörgang
präaurik. Grübchen/Anhängsel
vorspringendes Kinn
Leistenbruch
atypische Vierfingerfurche
dysplastische Nägel
Phalangenhypoplasie
typische Vierfingerfurche
lange, schmale Finger
Brushfield'sche Flecken

Bei weniger als 1/10 der
Patienten

Nystagmus
Anomalien d. äuß. Genitale
(außer Hypospadie)
großer Mund
kleiner Mund
Thoraxdeformität
Syndaktylie
nur 1 Beugefurche (Kleinf.)
Rectusdiastase
Fingerkontrakturen
Muskelhypertonie
Mikrophthalmus
Polydaktylie

Tabelle 12: Häufigkeit klinischer Merkmale bei den Patienten
mit Chromosomenstörung

Patientengruppe

I II III

Herzfehler	8	9	9
Verdacht auf Herzfehler	5	6	4
Mißbildungen der Nieren und ableitenden Harnwege	5/11	7/11	
Patienten mit Mißbildungen der Inneren Organe (außer Herz- fehler) insgesamt	12	4	
Augenhintergrund auffällig	5/19	5/29	
Allgemeinstörung (A) oder Krampfpotentiale (K) im EEG	A: 5/19 K: 4/19	1/25 4/25	
Ventrikelerweiterung (3. Ventrikel über 8 mm im Schoencephalogramm)	11/22	7/25	
Verminnerung der Immunglobuline	5/18	1/4	

Tabelle 15: Häufigkeit innerer Mißbildungen und
pathologischer Befunde bei Zusatzuntersuchungen

	I	II
Knochenalter unter 2 Sigma	10 / 18*	4 / 20
<u>Schädel</u>		
Brachycephalus	6 / 24	3 / 26
Dolichocephalus	4 / 24	1 / 26
<u>Rippen</u>		
Fehlende Rippen	3 / 25	4 / 19
13. Rippe	1 / 25	3 / 19
Verschmelzungsrippe	1 / 25	0 / 19
Hypoplast. 1. Rippe	1 / 25	0 / 19
Normal:	19 / 25	12 / 19
<u>Wirbelsäule</u>		
Quadratische Wirbelkörper	3 / 20	1 / 21
Bogenspalten	3 / 20	1 / 21
Keilwirbel	0 / 20	1 / 21
Normal:	14 / 20	18 / 21
<u>Becken</u>		
Spaltbecken	1 / 22	0 / 23
Hüftluxation	2 / 22	1 / 23
Hüftdysplasie	6 / 22	3 / 23
Formanomalien der Beckenschaufeln	3 / 22	0 / 23
Coxa valga	6 / 22	4 / 23
Normal:	5 / 22	16 / 23
<u>Hand</u>		
Klinodaktylie V	8 / 21	7 / 26
Brachymesophalangie V	7 / 21	6 / 26
Sonstige Phalangenhypo- oder -aplasien	3 / 21	2 / 26
Normal:	7 / 21	11 / 26
<u>Fuß</u>		
Fußdeformitäten	4 / 11	2 / 4
Metatarsalia verlagert oder verkürzt	2 / 11	0 / 4
Phalangenhypoplasie	2 / 11	0 / 4
Polydaktylie	1 / 11	0 / 4
Normal:	4 / 11	2 / 4

Tabelle 14: Röntgenologisch nachgewiesene Skelettveränderungen

* d.h.: bei 10 von 18 darauf untersuchten Patienten wurde dieses Merkmal gefunden

Mangelgeburt

Körpergröße unter 3. Percentile

Gewicht unter 3. Percentile

Kopfumfang unter 3. Percentile

flacher Hinterkopf

breite Nasenwurzel

kleines Kinn

Lippen - Kiefer- und/oder Gaumenspalten

nach außen ansteigende Lidachsen

Strabismus

tiefsitzende Ohren

dysplastische Ohren

kurzer Hals

Sydneylinie

Klinodaktylie des Kleinfingers

Fußdeformitäten (außer Sichelfuß)

Zehenstellungsanomalien

Muskelhypotonie

bei den männlichen Patienten Kryptorchismus

Tabelle 16: Merkmale, die bei Patienten mit Chromosomenstörungen signifikant* häufiger als bei der Stichprobe zufällig ausgewählter Klinikpatienten vorkamen

* s. Fußnote S. 17

1	11
0,12	0,11
0,20	0,10
0,22	0,10
0,41	0,10
0,41	0,10
0,41	0,22
0,41	0,22
0,41	0,22
0,41	0,24
0,41	0,24
0,44	0,29
0,44	0,29
0,44	0,29
0,44	0,33
0,50	0,33
0,53	0,33
0,53	0,36
0,56	0,39
0,59	0,39
0,59	0,39
0,59	0,39
0,59	0,39
0,61	0,41
0,61	0,44
0,61	0,44
0,65	0,47
0,67	0,47
0,77	0,50
0,77	0,53
0,77	0,65
0,77	0,65
0,78	0,67

Tabelle 17: Werte für den Quotienten $\frac{\text{Anzahl vorhandener Merkmale}}{\text{Anzahl untersuchter Merkmale}}$ *

(*es handelt sich hierbei um die in Tabelle 16 aufgeführten Merkmale, außer Strabismus)

Autor	Kriterien der Patientenauswahl	Häufigkeit unbal. autosom. Chr. aberr. (außer Tris.D,E,G)	
Hamperston 1975 (19) Nielsen 1975 (27)	Konsekutiv erfaßte lebendigebo- rene Neugeborene	21 von 52,249	0,04 %
Summit 1969 (35)	"mentally defective children with three or more anomalies"(unbekann- ter Ätiologie)	3 von 50	6 %
Daly 1970 (8)	"patients with idiopathic mental retardation and at least three other anomalies"	4 von 50	8 %
Carrel 1975 (4)	"mental retardation and one or more major or minor congenital anoma- lies" (unbek. Ätiologie)	15 von 130	11,5 %
Erdtmann 1974 (9)	"mentally defective children with at least three anomalies"	4 von 51	8 %
Opitz 1975 (28)	Patienten mit "idiopathic MCA/MR- syndrome" (multiple congenital anomalies and mental retardation)	29 von 384	7,6 %
Thorburn 1971 (36)	"mentally retarded"	1 von 101	1 %
Aitken 1971 (1)	"male patients at a mental sub- normality hospital"	2 von 233	0,9 %
Newton 1972 (26)	"patients in a hospital for the mentally subnormal"	10 von 1.255	0,8 %
Cassiman 1975 (5)	"children with an IQ lower than 50"	16 von 857	1,9 %
German 1966 (10)	Patienten mit angeborenen Herzfeh- lern, in deren Familien gehäuft Herzfehler vorkamen	0 von 55	-
Conen 1969 (7)	Patienten mit Syndaktylie	0 von 105	-
Chen 1971 (6)	Kinder mit Hypospadie	0 von 26	-

Tabelle 10: Häufigkeit unbalancierter autosomaler Chromosomenaberrationen (außer Trisomie D,E,G) bei Serienuntersuchungen von Patienten, die nach bestimmten klinischen Merkmalen ausgewählt wurden




Abb. 1: Altersverteilung der Patienten in den verschiedenen Gruppen.




Abb. 2: Anzahl der in Tabelle 16 aufgeführten Merkmale beim einzelnen Patienten (die Merkmale: Strabismus und Kryptorchismus wurden nicht berücksichtigt)

LITERATUR

1. Aitken, J., M. Brunton, P.A. Jacobs, W.H. Price, K. MacColl:
Chromosome studies on male patients at a mental sub-
normality hospital.
Clin. Genet. 2, 358, 1971
2. Bergsma, D.:
Paris Conference (1971): Standardization in Human Cyto-
genetics.
Birth Defects Original Article Series, Vol. VIII, No.7, 1972
3. Bergsma, D.:
Birth Defects. Atlas and Compendium.
Baltimore: Williams and Wilkins 1973
4. Carrel, R.E., R.S. Sparkes, St. W. Wright:
Chromosome survey of moderately to profoundly retarded
patients.
Amer.J.Ment.Defic. 77, 616, 1973
5. Cassiman, J.J., J.P. Fryns, J. De Roover, H. Van den Berghe:
Sex chromatin and cytogenetic survey of 10417 adult males
and 357 children institutionalized in belgian institutions
for mentally retarded patients.
Humangenetik 28, 43, 1975
6. Chen, Y.C., P.V. Woolley:
Genetic studies on hypospadias in males.
J. Med. Genet. 8, 153, 1971
7. Conen, P.E., M.K. Hampole, H.G. Thomson:
Chromosome abnormalities in patients with syndactyly.
Can. Med. Ass. J. 101, 597, 1969
8. Daly, R.F.:
Chromosome aberrations in 50 patients with idiopathic
mental retardation and in 50 control subjects.
J. Pediat. 77, 444, 1970

9. Erutmann, b., F.M. Salzano, M.S. Mattevi:
Chromosome studies in patients with congenital malformations and mental retardation.
Humangenetik 20, 297, 1975
10. German, J., K.H. Ehlers, M.A. Engle:
Familial congenital heart disease. II. Chromosomal studies.
Circulation 54, 517, 1966
11. Greulich, W.W., S.I. Pyle:
Radiographic atlas of skeletal development of the hand and wrist.
Stanford, California: Stanford University Press 1970
12. Grosse, K.-P., H.-D. Rott, M. Meyer-Kobisch, G. Schwanitz:
Deficiencia en el brazo corto de un cromosoma E₁₈ (síndrome de deGrouchy). Aportación casuística y revisión bibliográfica.
Folia Clinica Internacional 20, 3, 1970
13. Grosse, K.-P., B. Böwing, F. Hopfengärtner, G. Reinhardt, C.F. Sitzmann:
Ring G-Chromosom. Zwei kasuistische Beiträge und Literaturübersicht.
Humangenetik 12, 142, 1971
14. Grosse, K.-P., G. Schwanitz, H.-D. Rott, K. Klein, J.v.Zyl:
E₁₈-Ringchromosom, Kasuistik und Übersicht.
Klin. Pädiat. 184, 495, 1972
15. Grosse, K.-P., G. Schwanitz:
Ein neues Syndrom durch Chromosomenstückverlust (13 q-). Kasuistik und Zusammenstellung der Symptomatik.
Klin. Pädiat. 185, 468, 1973
16. Grosse, K.-P., G. Schwanitz:
Diagnostik und genetische Beratung bei reziproken Chromosomentranslokationen, dargestellt am Beispiel einer familiären A/E-Translokation.
Mschr. Kinderheilk. 121, 108, 1973

17. Grosse, K.-P., G. Schwanitz, H. Singer, V. Wieczorek:
Partial trisomy 10p.
Humangenetik, 29, 141, 1975
18. Hamerton, J.L.:
Human cytogenetics.
New York, London: Academic Press 1971
19. Hamerton, J.L., N. Canning, M. Ray, S. Smith:
A cytogenetic survey of 14,069 newborn infants.
Clin. Genet. 8, 223, 1975
20. Heierli, E.:
Longitudinale Wachstumsstudie. Resultate von Länge, Gewicht und Kopfumfang in den ersten 4 Lebensjahren.
Helv. paediat. Acta 15, 311, 1960
21. Hienz, H.A.:
Chromosomen - Fibel.
Stuttgart: Georg Thieme Verlag 1971
22. Holmes, L.B.:
Mental retardation. An atlas of diseases with associated physical abnormalities.
New York: The Macmillan Company 1972
23. Lejeune, J., M. Gautier, R. Turpin:
Etudes des chromosomes somatiques de neuf enfants mongoliens.
C. R. Acad. Sci. (Paris) 248, 1721, 1959
24. Lewandowski, R.C., J.J. Yunis:
New chromosomal syndromes.
Amer. J. Dis. Child. 129, 515, 1975
25. Lubchenco, L.O., Ch. Hausmann, E. Boyd:
Intrauterine growth in length and head circumference as estimated from live births at gestational ages from 20 to 42 weeks.
Pediatrics 57, 403, 1960

26. Newton, M.S., C. Cunningham, P.A. Jacobs, W.H. Price,
I.A. Fraser:

Chromosome survey of a hospital for the mentally sub-
normal. Part 2: Autosomal abnormalities.
Clin. Gen. 3, 226, 1972

27. Nielsen, J., I. Sillesen:

Incidence of chromosome aberrations among 11 148 newborn
children.
Humangenetik 30, 1, 1975

28. Opitz, J.M.:

Diagnostic/genetic studies in severe mental retardation.
Presented at the meeting on Genetic Counseling, Colorado
Springs, February 26-27, 1975. Proceedings to be published,
edited by Dr. H.A. Lubs

29. Pfeiffer, R.A.:

Karyotyp und Phänotyp der autosomalen Chromosomenaberra-
tionen beim Menschen.
Stuttgart: Gustav Fischer-Verlag 1968

30. Rott, H.D., G. Schwanitz, K.-P. Grosse:

Partielle Trisomie C₉ bei balancierter B₄/C₉-Translokation
bei der Mutter.
Z. Kinderheilk. 109, 293, 1971

31. Sachs, L.:

Statistische Auswertungsmethoden.
Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag 1972

32. Schwanitz, G., K.-P. Grosse:

Partial trisomy 4p with translocation 4p⁻, 22p⁺ in the
father.
Ann. Génét. 16, 203, 1973

33. Schwanitz, G., K.-P. Grosse, U. Semmelmayr, H. Mangold:

Partielle freie Trisomie 13 in einer Familie mit balancier-
ter Translokation (13q⁻;10q⁺).
Mscr. Kinderheilk. 122, 337, 1974

34. Schwanitz, G., M. Reither, G. Grosse, Ch. Nagels,
K.-P. Grosse, U. Gutfried:
Partial monosomy 15 as the result of a balanced translo-
cation 5/15 pat.
Humangenetik 28, 95, 1975
35. Summitt, R.L.:
Cytogenetics in mentally defective children with
anomalies: A controlled study.
J. Pediat. 74, 58, 1969
36. Thorburn, M.J., P.A. Martin:
Chromosome studies in 101 mentally handicapped jamaican
children.
J. Med. Genet. 8, 59, 1971
37. Vaughan, V.C., R.J. McKay:
Nelson, Textbook of Pediatrics.
Philadelphia, Toronto, London: W.B. Saunders Company 1975
38. Zink, U., R. Rix, K.-P. Grosse, G. Schwanitz:
Ringchromosom D₁₅. Kasuistik und Übersicht.
Klin. Pädiat. 183, 192, 1973

ANAMNESTISCHE DATEN

Fragebogen Nr. 1
Mutter:
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Unternehmen: (Beschäftigung)
Vater:

Name: Geb.datum:
Wohnung:
Geb.daten der Eltern: Stellung in d. Geschw.reihe:
Fehlgeburten, Totgeburten:
Stammbaum (falls nötig, Beiblatt):
(Finden sich bei den Eltern ähnliche Dysmorphien wie beim Kind?
Welche? Intelligenz?)

SCHWANGERSCHAFTSANAMNESE

Medikamente: welche
wann
wie lange
wieviel
Röntgenuntersuchungen: welche
wann
Erkrankungen: welche
wann
Berufliche Belastung der Mutter:
Blutungen: wann
wie stark
wie lange

GEBURTSANAMNESE

VNT: Geb.gewicht: Länge: Kopfumfang:
Dauer (vom Beginn regelmäßiger Wehen gerechnet):
Lage:
Besonderheiten:
Ikterus, Blutgruppenunverträglichkeit:
Bes. Maßnahmen nach der Geburt:

EIGENE KRANKHEITSANAMNESE

Infekte, Op., stat. Behandlungen:
Medikamente, Rö-Unters. in d. letzten 2 Jahren:

ENTWICKLUNGSANAMNESE

Sitzen mit: Laufen mit:
Kontakt mit der Umwelt: Schule:
Erste Worte mit: Zweiwortsatz mit:
Ohne Windeln seit: Erste Zähne mit:

Alter bei der Untersuchung:

Datum der Untersuchung:

Größe:

Gewicht:

Kopfumfang:

Fotos (auf Beiblatt): Ganzkörper von vorn

Kopf a-p und seitlich

Detaillfotos von:

KOPF

Ausladender Hinterkopf
Flacher Hinterkopf
Fontanellen
Fliehende Stirn
Flaches Gesichtsprofil
Mittelgesichtsdisplasie
(=eingezogene Nasomaxillargegend, sodaß Kinn u. Stirn vorspringen)
Vorspringende Nasenwurzel
Flache Nasenwurzel
Breite Nasenwurzel
Kleines Kinn
Mondgesicht
Lippen-Kiefer-Gaumenspalte
Sonstiges:

Abfallende Mundwinkel
Heraushängende Zunge
Gefurchte Zunge
Gaumen hoch? schmal?
Zahnanomalien (welche?)
Karies
Sonstiges:

NACKEN

Breit und Kurz
Überschüssige Nackenhaut
Tiefer Haaransatz
Pterygium colli
Sonstiges:

AUGEN

Schräge Lidspalten
(mongoloid? antimongoloid?)
Enge Lidspalten (re/li)
Epikanthus
Mikro-, Anophthalmie
Katarakt (re/li)
Kolobom (re/li)
Brushfield'sche Flecken
Strabismus
Nystagmus
Sonstiges:

RUMPF

Schildthorax
Hypoplastische Brustwarzen
Rectusastase
Nabelbruch
Leistenbruch (re/li)
Kryptorchismus (re/li)
Abnormes Genitale
Sonstiges:

HÄNDE UND FÜSSE

Kurze und breite Hände
Vierfingerfurche (re/li)
Syndaktylie (wo?)
Polydaktylie (wo?)
Lange, schmale Finger
Fingerkontrakturen
Dysplast. Fingernägel (wie?)
Klinodaktylie (re/li)
Kurzer V. Finger (re/li)
Dysplast. Mittelphalanx V (Rö)
Nur 1 Beugefurche am V. Finger
Weiter Abstand zw. 1. u. 2. Zehe
Plantarfurche (1. Zw.zehenraum)
Kurze Großzehe, dorsalflektiert
Deformierte Füße (wie?)
Ödeme
Sonstiges:

OHREN

Tiefsitzend
Abstehend
Groß
Dysplastisch (wie?)
Gehörgang eng oder atretisch
Präauriculäres Grübchen/Fisteln
Sonstiges:

MUND

Meist offen
Klein

ALLGEMEINE ANAMNESE:

Geburtsdatum, -ort:
Überwintung im Ausland:
Auswärtige Kontakte:
Auswärtige Kontakte:
Auswärtige Kontakte:
Sonstiges:

ALLGEMEINE ANAMNESE:

Überwintung im Ausland:
Auswärtige Kontakte:
Auswärtige Kontakte:
Sonstiges:

INNERE MISCHBEFUNDEN:

Herz, Gefäße (welche?)
Urogenitalorgane (welche?)
Andere Mißb. d. Inn. Organe

INNERE MISCHBEFUNDEN:

Hypertrophische Pylorusstenose
Saug- oder Trinkschwäche
Hämangiome (wo, welcher Art?)
Krampfanfälle
Katzenschrei

PAPILLARLISTEN:

SINNESORGANE:

Kind sieht: ja/nein Augenärztliche Untersuchung
Kind hört: ja/nein

NEUROLOGISCHE UNTERSUCHUNG:

KNOCHENALTER:

Iq, Bq:

RÖ - SCHÄDEL:

EEG:

ECHO:

ANTI-KÖRPER-TITER: Toxoplasma:

Röteln:
Dues:
Cytoregalie:
Listeriose:

AMINOACIDUROGRAMM:

FeCl₃ - PROBE (bzw. Guthrie-Test):

MFS:

ZUSÄTZLICHE SONDERUNTERSUCHUNGEN

PMF: ENDOCRINOL. UNTERS.:

BARR-TEST: DRUMSTICKS:

CHROMOSOMENANALYSE: BLUTGRUPPEN:

FERMENTE:

SONSTIGES:

Tabellarische Darstellung der Befunde der einzelnen Patienten

Patienten mit Chromosomenstörungen (Gruppe I)

Unter der jeweiligen Fallnummer des Patienten sind die Befunde zu den auf dem Bandstreifen aufgeführten Merkmalen angegeben.

I. 1	I. 2	I. 3	I. 4	I. 5	I. 6	I. 7	I. 8	11. Nr.
♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	Geschlecht
3 q+	4 p+	4 q+	4 p+	5 p+	5 p+	5 p+	7 a+	Chromosomenbefund
familiär	familiär	familiär	familiär	sporadisch	sporadisch	familiär	sporadisch	(Karyogramm)
34	28	22	28	26	32	25	34	Alter der Eltern Mutter
36	28	24	37	28	29	27	37	Vater
3 (3)	1 (1)	1 (1)	2 (3)	2 (2)	2 (3)	1 (1)	2 (2)	Stellung i. d. Geschwisterreihe
4 Bräuter mit gleicher Chromosomenveränderung	Ø	Ø	4 Bräuter mit gleicher Chromosomenveränderung	Ø	Ø	Ø	Ø	Familienanamnese
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	1 (M.B.)	Aborte
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Geburten
Ø	Ø	2 Tage länger (M.B.)	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Erkrankungen der Fellgenossen (nach Art der Erkrankungen)
Ø	Ø	Ø	/	Ø	Ø	Ø	Ø	Medikamente
Ø	Ø	Ø	/	Ø	Ø	Ø	Ø	Röntgenuntersuchungen
Ø	Ø	+ M.B.	/	Ø	Ø	Ø	Ø	Blutungen
+ 10	- 7	+ 12	ET	- 12	ET	ET	+ 7	Geburtsanamnese
4 000	2 750	2 660	3 800	2 640	2 900	2 760	2 600	+ Tage vor nach ET
54	49	49	53	46	—	49	40	Geburtsgewicht
—	32,5	36	32	32	—	—	30,5	Länge
Kopflänge	Kopflänge	—	Kopflänge	I. H.L.	Kopflänge	Kopflänge	II. H.L.	Kopfumfang
I Mon.	10 Mon.	—	—	18 Mon.	Ø	—	—	Lage
2 J.	2 J. 5 Mon.	—	19 Mon.	Ø	Ø	2 J.	—	Entwicklungsanamnese
Ø	3 J.	—	(Spont.)	Ø	Ø	19 Mon.	—	Sitzen
—	6 Mon.	—	7 Mon.	—	7 Mon.	12 Mon.	—	Laufen
—	Ø	—	3 J. 6 Mon.	Ø	Ø	—	—	Sprechen
—	—	—	—	—	—	—	—	Zeichnen
—	—	—	—	—	—	—	—	Saubere
++ (0,32)	+ (0,58)	—	+ (0,58)	+++	+++	++	—	Stark - geistige Retardierung
2 J. 1 Mon.	24 Mon.	3 Wo.	14 J. 3 Mon.	2 J. 10 Mon.	2 J. 3 Mon.	6 J. 2 Mon.	19 J.	Untersuchungsberichte
84	87	50	142	87	88,5	106,5	42	Alter bei der Untersuchung
(≤ 40)	(≤ 50)	(≤ 3)	(≤ 3)	(≤ 3)	(≤ 50)	(≤ 3)	(≤ 3)	Größe
11 000	12 250	3 040	36 300	8 700	10 700	19 500	2 610	(Percentile)
(≤ 40)	(≤ 50)	(≤ 40)	(≤ 40)	(≤ 3)	(≤ 3)	(≤ 50)	(≤ 3)	Geistige
45	48,5	32	55	40,5	45	52,5	29,5	(Percentile)
(≤ 3)	(≤ 50)	(≤ 3)	(≤ 30)	(≤ 3)	(≤ 3)	(≤ 30)	(≤ 3)	Intelligenz
Ø	Ø	25 J.	Ø	Ø	Ø	Ø	12 Wo.	(Percentile)
—	—	+	—	—	—	—	+	Erkrankungen im Alter von

I. 25.	I. 26.	I. 27.	⁻⁶⁹⁻ I. 28.	I. 29.	I. 30.	I. 31.	III - Nr.:
♀	♂	♂	♀	♂	♀	♀	Geschlecht
21.11.	Mar 18	Mar 13	Mar 7	Mosaikmar	+ mar	+ C(p,9p)	Chromosomenbefund (Kurzform)
sporadisch	familiär	sporadisch	familiär	sporadisch	sporadisch	sporadisch	
18. 22.	19 22	21 22	31 32	24 27	21 23	28 23	Alter der Eltern Mutter Vater
1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	3 (3)	Stellg. i. d. Geschwisterreihe
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	-	Finalionanamnese
Ø	1 M. II	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Aborte
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Totgeburten
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Störungen der Frühschwangerschaft Erkrankungen
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Medikamente
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Röntgenuntersuchungen
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Blutungen
							Geburtsanamnese
+ 21	+ 15	+ 21	ET	+ 12	- 7	+ 7	- Tage vor + Tage nach ET
2400	3800	2950	2600	2920	3250	2440	Geburtsgewicht
48,5	52	50	50	52	52	48	Länge
29,5	-	-	35	36,5	35,5	30,8	Kopfumfang
II. HHL	Kopflage	Kopflage	-	Volle Steilblage	Kopflage	II. HHL	Lage
27.3 Mon.	12 Mon.	Ø	-	Ø	-	-	Entwicklungsanamnese
37.6 Mon.	16 Mon.	-	-	-	-	-	Sitzen
27.	(Spricht)	-	-	-	-	-	Laufen
6 Mon.	-	-	-	~ 7 Mon.	-	-	Sprechen
Ø	37.6 Mon.	-	-	-	-	-	Zähne
++ (0,39)	+	+	-	+	-	-	Sauber
							Statisch - geistige Retardierung
							Untersuchungsbefunde
12,5 Mon.	10,2 Mon.	8,5 Mon.	2 T.	10 Mon.	8 T.	2 T.	Alter bei der Untersuchung
68 (27)	137 (480)	73 (90)	50 (25)	75 (490)	54 (90)	48 (3)	Größe (Percentile)
5500 (23)	43000 (297)	8040 (25)	2600 (10)	10050 (75)	3100 (25)	2460 (210)	Gewicht (Percentile)
38,5 (23)	52,5 (50)	41 (23)	35 (50)	47 (75)	35 (25)	30,8 (23)	Kopfumfang (Percentile)
47.6 Mon.	Ø	Ø	28 T.	Ø	15 T.	13 T.	verstarben im Alter von
Ø			+		+	+	Sektion

I. 1.	I. 2.	I. 3.	I. 4.	I. 5.	I. 6.	I. 7.	I. 8.	all-Br.
								Kopf
0	0	0	0	0	0	+	0	Ausklonder Hinterkopf
0	0	0	0	0	+	0	0	Flacher Hinterkopf
0	0	0	0	+	+	0	0	Vorspringende Nasenwurzel
+	+	0	0	0	0	+	0	Flache Nasenwurzel
+	+	(+)	0	+	+	+	+	Hohe Nasenwurzel
0	0	0	+	0	0	+	0	Vorspringendes Kinn
+	+	+	0	+	0	0	+	Kleines Kinn
0	0	0	0	0	0	0	0	Lippen - Kiefer - Gaumenspalte
+	0	Spalte	+	0	0	0	0	Hoher Gaumen
								Augen
+	+	0	0	0	0	+	0	Nach außen anstehende Lidachsen
0	0	0	0	(+)	0	0	+	Nach außen abfallende Lidachsen
0	+ / 4	0	0	0	0	0	0	Enge Lidspalten (ro/li)
0	+ / 1	0	0	0	+ / 1	0	0	Epikanthus
0	0	0	0	0	0	0	0	Mikro-, Anophthalmie
0	0	0	0	0	0	0	0	Katarakt
0	0	0	0	0	0	0	0	Kolebom
0	(+)	0	0	0	+	0	0	Brushfield'sche Flecken
+ conv.	0	-	0	0	0	+ conv.	-	Strabismus
0	0	-	0	0	0	0	-	Nystagmus
								Ohren
0	0	+	0	0	+	+	0	Tiefsitzend
0	+ / 0	0	0	0	0	0	0	Abstehend
(+ / 0)	+ / 1	+ / 1	(+ / 1)	+ / 1	0	+ / 1	+ / 1	Dysplastisch
0	0	0	0	0	0	0	0	Gehörgang eng oder atretisch
0	0	0	0	0	0	0	0	Präaurikulares Grübchen, Anhängsel
								Mund
0	0	0	0	0	0	+	+	Groß
0	0	0	0	0	0	0	0	Klein
0	+	-	-	-	+	+	-	Zahnstellungsanomalien
								Nacken
+	+	+	0	0	0	0	+	Kurzer Hals
0	0	-	0	0	0	0	0	Überschüssige Nackenhaut

I. 9.	I. 10.	I. 11.	I. 12.	I. 13.	I. 14.	I. 15.	I. 16.	all. Nr.
0°	15°	15°	15°	15°	+	0°	0°	1001
+	15°	15°	+	(+)	0°	+	+	Ausladender Hinterkopf
15°	0°	+	+	+	0°	+	+	Flacher Hinterkopf
15°	0°	0°	15°	0°	+	0°	15°	Vorspringende Nasenwurzel
+	0°	0°	+	+	+	+	+	Flache Nasenwurzel
0	15°	0°	15°	+	15°	15°	15°	Breite Nasenwurzel
+	+	+	+	0°	+	+	0°	Vorspringendes Kinn
15°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	+	Kleines Kinn
15°	+	0°	0°	0°	+	0°	+	Lippen - Kiefer - Gaumenspalto
								Hoher Gaumen
+	0°	15°	0°	(+)	0°	+	0°	<u>Augen</u>
0°	15°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	Nach außen ansteigende Lidachsen
15°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	Nach außen abfallende Lidachsen
0°	15°	0°	0°	0°	0°	+	+	Enge Lidspalten (ro/li)
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	Epikanthus
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	Mikro-, Anophthalmie
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	Katarakt
0°	0°	0°	0°	0°	0°	+	+	Kolobom
0°	15°	0°	0°	+	0°	+	+	Brushfield'sche Flecken
0°	15°	0°	0°	0°	+	+	+	Strabismus
0°	15°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	Mydriasmus
0°	15°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	<u>Ohren</u>
0°	+	+	0°	+	+	+	0°	Tiefsitzend
+	+	+	0°	0°	0°	0°	0°	Absteigend
+	+	+	+	+	+	0°	15°	Dysplastisch
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	Gehörang eng oder atretisch
0°	0°	0°	0°	0°	+	+	0°	Präaurikulares Grübchen, Anhängsel
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	<u>Mund</u>
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	Groß
0°	0°	0°	0°	0°	0°	+	0°	Klein
0°	0°	0°	0°	+	0°	+	0°	Zahnstellungsanomalien
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	<u>Nachen</u>
0°	+	+	+	0°	0°	+	0°	Kürzer Hals
0°	+	+	0°	0°	0°	0°	0°	Überschüssige Nackenhaut

T 25	T 26	T 27	T 28	T 29	T 30	T 31	Pall.-Nr.
Ø	Ø	Ø	+	+	+	Ø	Kopf
+	+	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ausladender Hinterkopf
Ø	Ø	Ø	Ø	(+)	Ø	+	Flacher Hinterkopf
+	+	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Vorspringende Nasenwurzel
+	+	+	+	+	+	+	Flache Nasenwurzel
Ø	(+)	Ø	Ø	+	Ø	Ø	Breite Nasenwurzel
Ø	Ø	+	+	+	+	Ø	Vorspringendes Kinn
Ø	+	Ø	Ø	Ø	Ø	+	Kleines Kinn
Ø	Spalte!	+	+	+	+	+ LKG 4	Lippen - Kiefer - Gaumenspalte
						Spalte!	Hoher Gaumen
+	(+)	Ø	Ø	+	Ø	Ø	Augen
Ø	Ø	Ø	+	Ø	+	+	Nach außen ansteigende Lidachsen
(+)(+)	Ø	(+)(+)	Ø	Ø	Ø	+ (+)	Nach außen abfallende Lidachsen
+ (+)	+ (+)	+ (+)	Ø	Ø	Ø	+ (+)	Enge Lidspalten (ro/li)
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Epikantus
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Mikro-, Anophthalmie
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	-	Katarakt
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	-	Kolobom
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	-	Brushfield'sche Flecken
Ø	Ø	+ conv.	-	Ø	-	-	Strabismus
Ø	Ø	Ø	-	Ø	-	-	Nystagmus
Ø	+	Ø	+	Ø	+	+	Ohren
+ (+)	+	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Tiefsitzend
+ (+)	+ (+)	+ (+)	+ (+)	Ø	+ (+)	+ (+)	Abstehend
Ø	Ø	+ eng	Ø	Ø	+ re str.	Ø	Dysplastisch
Ø	Ø	Ø	Ø + Gr-bu	Ø	+ 10 Anhäng.	Ø	Gehörang eng oder atretisch
							Präaurikulares Grubchen, Anhängsel
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Mund
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Groß
-	+	+	-	Ø	-	-	Klein
							Zahnstellungsanomalien
+	+	+	+	Ø	+	+	Nacken
+	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	-	Kurzer Hals
							Überschüssige Nackenhaut

[illegible]

[illegible]

-68-								Fall-Nr.
7 14	T 16	T 17	T 20	T 21	T 22	T 23	T 24	
								Rumpf
								Thoraxdeformität
								Rectusdiastase
								Nabelbruch
								Leistenbruch (re/li)
Carpalli	entfalt	entfalt	+ 1+	+ 1+	(+11) Knoch.	+ 1+	entfalt	Kryptorchismus (re/li)
			+ Meier-Raum		+ 5/10-21	+ 5/10-21		Abnormes Genitale
								Hände und Füße
								Kurze und breite Hände
								Typische Vierfingerfurche (re/li)
+ 10				+ 10				Sidneyline (re/li)
								Atypische Vierfingerfurche (Übergangstyp) (re/li)
	+ 6. Zehn							Syndaktylie
	+ 6. Zehn							Polydaktylie
								Lange, schmale Finger
								Fingerkontrakturen
								Dysplastische Finger- und/oder Zehenmägel
+ 1+					(6) 10	+ 1+		Klinodaktylie des Kleinfingers (re/li)
					(+11/14)	(1) 14	+ 1+	Kurzer Kleinfinger (re/li)
								Stenige Phalangenhypoplasie
								Nur 1 Baugefurche am Kleinfinger
								Weiter Abstand zwischen 1. und 2. Zehn
	+ 1+				+ 1+			Plantarfurche (1. Zwischenzehenraum)
		+ Platt-Knoch.	+ Knoch.-Nackel		flach-K.	+ Platt-K.	+ Platt-K.	Fußdeformitäten
								Zehenstellungsanomalien
								Gelenke, Muskeln
								Muskelhypotonie
								Muskelhypertonie
								Veränderungen des Skeletts
								Knochenalter unter 2 Sigma
								Schädelanomalien
Brachyceph.	+ Gehirndiel. Wasserb.	+ Doli-ch. Gehirnwasser						Rippenanomalien
	+ 1. Gr. 1. Hals							WS - Anomalien
	+ Spinalnerv. Hals							Duckensanomalien
	+ Hüftgelenk. bds.	+ Hüftgelenk.		+ Coxa valga		+ Coxa valga	+ Coxa valga	Klinodaktylie V
								Brachycephalopodangia V
								Anomalien am Fußskelett
	+ 6. Zehn				+ Metatars. II vergrößert		+ Plabf	von Ligon

Brachycephal.
V. Trüger

1. 29.	1 76	7 27.	7. 28.	7 29.	7 30.	7. 31.
R	S	B	S	S	S	Fall-Nr.
S	S	S	S	S	S	<u>Rumpf</u>
S	S	S	S	S	S	Thoraxdeformität
S	S	S	S	S	S	Rectusdiastase
S	S	S	S	S	S	Nabelbruch
S	S	S	S	S	S	Leistenbruch (ro/li)
S	S	S	S	S	S	Kryptorchismus (ro/li)
S	S	S	S	S	S	Abnormes Genitale
S	S	S	S	S	S	<u>Hände und Füße</u>
S	S	S	S	S	S	Kurze und breite Hände
S	S	S	S	S	S	Typische Vierfingerfurche (ro/li)
S	S	S	S	S	S	Sidneyline (ro/li)
S	S	S	S	S	S	Atypische Vierfingerfurche (Übergangstyp) (ro/li)
S	S	S	S	S	S	Syndaktylie
S	S	S	S	S	S	Polydaktylie
S	S	S	S	S	S	Lange, schmale Finger
S	S	S	S	S	S	Fingerkontrakturen
S	S	S	S	S	S	Dysplastische Finger- und/oder Zehenmängel
S	S	S	S	S	S	Klinodaktylie des Kleinfingers (ro/li)
S	S	S	S	S	S	Kurzer Kleinfinger (ro/li)
S	S	S	S	S	S	Sonstige Phalangenhypoplasie
S	S	S	S	S	S	Nur 1 Beugefurche am Kleinfinger
S	S	S	S	S	S	Weiter Abstand zwischen 1. und 2. Zehe
S	S	S	S	S	S	Plantarfurche (1. Zwischenzehenraum)
S	S	S	S	S	S	Fußdeformitäten
S	S	S	S	S	S	Zahnstellungsanomalien
S	S	S	S	S	S	<u>Gelenke, Muskeln</u>
S	S	S	S	S	S	Muskelhypotonie
S	S	S	S	S	S	Muskelhypertonie
S	S	S	S	S	S	<u>Becken und Skellet</u>
S	S	S	S	S	S	Knochenalter unter 2 Sigma
S	S	S	S	S	S	Schädelanomalien
S	S	S	S	S	S	<u>Rippenanomalien</u>
S	S	S	S	S	S	<u>WS - Anomalien</u>
S	S	S	S	S	S	Buckenamnation
S	S	S	S	S	S	<u>Klinodaktylie V</u>
S	S	S	S	S	S	Brachymetaphalangia V
S	S	S	S	S	S	Anomalien am Fußskelett
S	S	S	S	S	S	Conduktion

[illegible]

I. 3.	I. 10.	I. 11.	I. 12.	I. 13.	I. 14.	I. 15.	I. 16.	Fall-Nr.
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	+ ASD	Ø	Ø	<u>Innere Missbildungen</u> Herz, Gefäße
+ v.v. Psyllops + Doppelblinder und -tauler Lins	✓	+ v.v. Psyllops + Netzhautab- gang an bitt. Hydrocephalus	✓	✓	Ø	✓	✓	Urogenitalorgane
		MDP: o.B.		abnorme Linsengr. Linsengr.	Encephalocel Hydroceph. int. et ext.			Andere Missbildungen der inneren Organe
✓	normal	normal	normal	+ Tortuosität Vasculum / Linsengr. / Linsengr. / Linsengr.	normal	+ Adipositas Katakoma	+ Papillen- Katakoma / Tortuosität Vasculum / papill. EKG	<u>Sonstige Befunde</u> Augenhintergrund
+	✓	✓	+	+	+	schlecht	+	Sicht
+	✓	✓	Schwachhörig	+	✓	+	+	Hört
Ø	Ø	Ø	+ An. transill. mit 2 Hm	Ø	Ø	Ø	Ø	Krankeinfachheit
+	Ø	K	Ø	Ø	Ø	✓	Ø	MDG (K. - ASD) - vergrößerte Ventrikel (K. - Transparenz)
+	(H)	+	Ø	Ø	Ø	+	Ø	Echocardiogramme (Ventrikelerweiterung)
3.8: 8.00 mm	3.6: 8.00 mm		3.6: 10 mm			3.6: 8 mm		
IgA +	normal	✓	✓	normal	normal	normal	✓	Immunglobuline quantitativ
	Verstärkte Stirnbehaarung Kühnheit Stirn- Augen-Partie Gebogene Nase Rachenfalte- hyperplasie	Verstärkte Stirnbehaarung Kühnheit Nasenuspitze		Hoch gewölbte Stirn Naschlächer auf- gewölbt	Hoch gewölbte Stirn			keine, keine, keine, keine, keine pathologische Befunde haben.

I 17	I 18	I 19	I 20	I 21	I 22	I 23	I 24	Fall-Nr.
+ VSD	(+) Verd.	Ø	Ø	Ø	(+) Verd.	+ Mitralinsuff.	(+) Verd.	<u>Innere Mißbildungen</u>
—	✓	—	—	i-v. Gangl. Ø	Ø	i-v. Gangl. Ø	—	Herz, Gefäße
								<u>Urogenitalorgane</u>
								<u>Andere Mißbildungen der inneren Organe</u>
				Luft-Enceph. Leichter Hydroceph. Hydroceph. ent. bsp. Hirn- atrophie	Luft-Enceph. Hydroceph. ent. bsp. Hirn- atrophie			
normal	—	normal	—	normal	normal	normal	normal	<u>Sonstige Befunde</u>
								<u>Augenhintergrund</u>
+	Ø	+	+	+	+	+	+	Sieht
—	—	+	—	+	Schwächung	Schwächung	+	Hört
Ø	Ø	Ø	Ø	+ große Ent. + Ent. d. Hirn.	Ø	Ø	Ø	Krampfanfälle
—	—	A	Ø	A	—	Ø	K	EEG (A = Allgemeinstörungen, K = Krampfpotential)
—	—	Ø	+	+	—	Ø	+	Echocardiogramm (Ventrikelvergrößerung)
							+	
normal	normal	normal	—	—	JgA (b)	normal	normal	Immunglobuline quantitativ
								<u>Weitere, bisher nicht aufgeführte pathologische Besonderheiten</u>
Spektroskop. des Erbgangs und Karyo.	Verstärkte Stirnhaare.	Vergewalt. Stirn Genua mens. vnta X-Beine	Keine Symptome	Keine Stimm, bei großer Hirnatrophie	Vergewalt. Stirn		Keine / geringer Stimm Genua mens. curvata	

I. 25.	I. 26.	I. 27.	I. 28.	I. 29.	I. 30.	I. 31.	Fall-Nr.
Ø	Ø	(+) Herd.	+ hochgrad. VSD off. For. oc.	(+) Herd.	+ kleine Defekt off. For. oc.	+ off. Def. off. For. oc.	<u>Innere Missbildungen</u> Herz, Gefäße
—	—	—	—	—	+ Micro- cephalie (33 cm) H.	+ Knochenschwäche Skull. u. H. + tiefe Geneth. Anomalie	Urogenitalorgane
		NBP: o.B.	Hydroceph. intern.		Hypogen bipar. def. intern. bicornis	Hypogen bipar. mit bicornis, def. intern. u. bicornis + Geneth. Anomalie + Hypogen bipar. + bicornis	Andere Missbildungen der inneren Organe
normal	—	—	—	—	—	—	<u>Ohre u. Sehbefunde</u> Augenhintergrund
+	+	+	—	+	—	—	Sicht
+	+	+	—	+	—	—	Hört
+ 3. A. u. 3. M. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.	—	—	—	—	—	—	Krampfanfälle
—	—	—	—	—	—	—	EEG (A = Allgemeinstörungen, K = Krampfpotential)
—	—	—	—	—	—	—	Echocardiogramme (Ventrikelerweiterung)
—	—	—	—	—	—	—	Immunoglobuline quantitativ
—	3. A. 6.	normal	—	3. A. 6.	—	—	Weitere, bisher nicht aufgeführte pathologische Besonderheiten
		Vorspringende Glaucoma	Hochgradige Strabismus.		Glaucoma asymmetrisch	Vorspringende Glaucoma	
			Strabismus.			Glaucoma.	

Tabellarische Darstellung der Befunde der einzelnen Patienten
Patienten mit statischen - geistiger Retardierung und multiplen
morphologischen Anomalien unbekannter Ursache (Gruppe II)

-75-								
II. 1.	II. 2.	II. 3.	II. 4.	II. 5.	II. 6.	II. 7.	II. 8.	Path. - Anam.
♀	♀	♂	♀	♂	♂	♂	♂	Geschlecht
normal (Struktur)	normal (Struktur)	normal (Struktur)	normal (Struktur)	normal (Struktur)	normal (Drain)	normal (Orcein)	normal (Struktur)	Chromosomenbefund (Kurzform)
18	23	20	21	27	23	35	23	Alter der Eltern Mutter
24	27	29	23	31	23	40	24	Vater
1 (1)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	4 (4)	3 (3)	2 (2)	2 (2)	Stellg. i. d. Geschwisterreihe
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Familienanamnese
♂	1 M II	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Aborte
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Totgeburten
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Störungen der Frühschwangerschaft
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Erkrankungen
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Medikamente
♂	♂	+ Länge M5	♂	♂	♂	♂	♂	Röntgenuntersuchungen
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Blutungen
								Geburtsanamnese
+ 14	+ 16	+ 3	+ 2	ET	ET	+ 10	+ 8	- Tage vor + Tage nach ET
2480	4400	3250	3050	3750	4000	3800	2440	Geburtsgewicht
47,5	57	50	50	54	50	52	48	Länge
32	34	-	33	36	-	34	30	Kopfumfang
Kopflage	Kopflage	Kopflage	Kopflage	Kopflage	Kopflage	Kopflage	I HHL	Lage
♂	♂	♂	12 Mon.	♂	-	-	-	Entwicklungsanamnese
-	-	-	27. 6 Mon.	♂	37. 8 Mon.	-	-	Sitzen
-	-	-	(spricht)	♂	♂	-	-	Laufen
-	-	♂	12 Mon.	3 Mon.	9 Mon.	-	-	Sprechen
-	-	-	47. 6 Mon.	♂	♂	-	-	Zähne
-	-	+	+	+	+ 11	-	-	Sauber
-	-	-	-	-	-	-	-	Statisch - geistige Retardierung
								Untersuchungsbefunde
6 Mon	6 Mon.	11 Mon	57 6 Mon	22 Mon	42 5 Mon.	2,5 Mon	17	Alter bei der Untersuchung
65	66	74	108	93	106	58	50	Größe
(50)	(75)	(75)	(25)	(92)	(75)	(50)	(15)	(Percentile)
6740	6630	6200	17100	14300	13500	4420	2950	Gewicht
(25)	(25)	(23)	(25)	(92)	(23)	(23)	(10)	(Percentile)
39	41	45	49	54	56	26	245	Kopfumfang
(23)	(40)	(40)	(25)	(92)	(92)	(23)	(25)	(Percentile)
♂	♂	♂	♂	♂	♂	3,5 Mon	2,5 Mon	verstorben im Alter von
-	-	-	-	-	-	+	♂	Sektion

[illegible]

2. 17.		2. 18.		2. 19.		2. 20.		2. 21.		2. 22.		2. 23.		2. 24.		Fam. - Nr.:	
♀	♀	♂	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	Geschlecht	
Normal (Orcein)	Normal (Orcein)	Normal (Struktur)	Normal (Struktur)	Normal (Struktur)	Normal (Orcein)	Normal (Orcein)	Normal (Orcein)	Normal (Orcein)	Normal (Orcein)	Normal (Orcein)	Normal (Orcein)	Normal (Orcein)	Normal (Orcein)	Normal (Orcein)	Normal (Orcein)	Chromosomenbefund (Kurzform)	
24 27	24 25	22 30	28 30	25 36	25 36	25 36	25 36	21 22	21 22	19 23	Alter der Eltern		Mutter Vater				
1 (3)	1 (3)	1 (2)	2 (3)	-	1 (4)	1 (4)	1 (4)	1 (4)	1 (4)	1 (4)	Stoß, i. d. Geschwisterreihe						
♂	♂	1 Schwarte Tric. 24	♂	-	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Familiennamense						
♂	♂	♂	♂	2 M. II	-	♂	♂	♂	♂	♂	Aborte						
♂	♂	♂	♂	-	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Totgeburten						
♂	♂	Grippe mit Fieber H. II	♂	-	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Störungen der Frühaufwachsenszeit						
♂	♂	Basophilie Gelenken H. II	♂	-	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Erkrankungen						
♂	♂	Basophilie Gelenken H. II	♂	-	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Medikamente						
♂	+ Lunge H. II	♂	♂	-	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Röntgenuntersuchungen						
♂	♂	♂	♂	-	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Blutungen						
Geburtsanamnese																	
ET	- 10	- 16	- 9	ET	- 35	ET	+ 2	+ Tage vor + Tage nach ET									
2000	3400	3880	3500	3780	3300	2250	3300	Geburtsgewicht									
57	-	53	-	53	51	47	54	Länge									
-	-	-	-	-	34,5	35	-	Kopfumfang									
Kopflänge	-	Kopflänge	Kopflänge	-	Kopflänge	Vollst. Steißlänge	-	Länge									
-	-	12. 3 Mon.	12.	♂	♂	(sitzen)	(sitzen)	Entwicklungsanamnese									
12.	12. 9 Mon.	♂	22. 3 Mon.	♂	-	♂	♂	Sitzen									
12.	12. 6 Mon.	22.	15 Mon.	♂	-	♂	12 Mon.	Laufen									
-	-	7 Mon.	9 Mon.	♂	-	12.	5 Mon.	Sprechen									
-	32. 6 Mon.	♂	♂	-	-	♂	-	Zähne									
+	+ (0,55)	++ (0,35)	+ (0,59)	+	-	++	+	Saubere									
Statisch - geistige Retardierung																	
Untersuchungsbeurteilung																	
107. 9 Mon.	132.	22. 4 Mon.	22. 7 Mon.	14 Mon.	6 Mon.	22. 1 Mon.	14. 5 Mon.	Alter bei der Untersuchung									
131,5 (± 50)	143 (± 40)	85 (± 3)	90 (± 5)	71 (± 40)	66 (± 50)	97 (± 92)	78 (± 90)	Größe									
33500 (± 50)	23500 (± 30)	11500 (± 40)	13400 (± 50)	5600 (± 3)	5500 (± 3)	13000 (± 70)	9700 (± 60)	Gewicht									
51 (± 50)	47 (± 3)	47 (± 3)	51 (± 25)	43 (± 40)	42 (± 3)	51 (± 30)	44 (± 3)	Kopfumfang									
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Kopfumfang (Percentile)									
verstorben im Alter von																	
Sektion																	

II. 1.	II. 2.	II. 3.	II. 4.	II. 5.	II. 6.	II. 7.	II. 8.	Fall-Nr.
0	0	0	0	0	0	0	+	Funt
0	0	0	0	0	0	0	0	Ausladender Hinterkopf
0	0	0	+	0	0	+	0	Flacher Hinterkopf
0	+	+	0	0	+	+	+	Vorpringende Nasenwurzel
0	0	0	+	0	+	0	0	Flache Nasenwurzel
+	0	+	+	(+)	+	+	+	Breite Nasenwurzel
+	(+)	0	0	0	0	0	0	Vorpringendes Kinn
0	0	+	0	0	0	+	+	Kleines Kinn
0	0	0	0	0	0	+	+	Lippen - Kiefer - Gaumenspalte
+	+	+	+	0	(+)	Spalte!	Spalte!	Harter Gaumen
+	+	0	0	0	(+)	0	0	ZUGEN
0	0	+	0	0	0	0	0	Nach außen ansteigende Lidachsen
+ / 0	(+ / +)	0	0	0	0	0	0	Nach außen abfallende Lidachsen
0	+ / +	0	0	+ / +	0	0	0	Enge Lidspalten (re/li)
0	0	0	0	0	0	0	0	Epicanthus
0	0	0	0	0	0	0	0	Mikro-, Anophthalmie
0	0	0	0	0	0	0	0	Katarakt
0	0	0	0	0	0	0	0	Kolobom
0	0	0	0	0	0	+ / +	0	Brushfield'sche Flecken
-	-	0	0	0	+ conv.	-	-	Strobismus
-	-	0	0	0	0	-	-	Nystagmus
0	0	+	0	0	+	+	0	Ohren
0	0	+	+	0	+	+	0	Tiefsetzond
0	0	(+) / (+)	0	0	0	0 / +	0	Abstehend
0	0	0	0	0	(+) / (+)	+ / +	+ / +	Dysplastisch
0	0	0	0	0	0	+ / + re/li eng	+ / + eng	Gehörgang eng oder atretisch
0	0	0	0	0	0	0	0	Präaurikulares Grübchen, Anhängsel
0	0	0	0	0	0	0	0	Mund
0	0	0	0	0	0	0	0	Groß
0	0	0	0	0	0	0	0	Klein
-	-	-	0	+	+	-	-	Zahnstellungsanomalien
0	0	0	0	0	0	0	+	Nacken
0	0	0	0	0	0	0	0	Kurzer Hals
0	0	0	0	0	0	0	0	Überschüssige Nackenhaut

<u>II. 9</u>	<u>II. 10</u>	<u>II. 11</u>	<u>II. 12</u>	<u>II. 13</u>	<u>II. 14</u>	<u>II. 15</u>	<u>II. 16</u>	<u>Fall-Nr.</u>
♂	♂	♂	+	♂	♂	♂	♂	Fohl
♂	♂	♂	♂	+	♂	+	(+)	Ausladender Hinterkopf
♂	+	(+)	♂	♂	♂	+	+	Flacher Hinterkopf
♂	♂	♂	♂	+	+	♂	♂	Vor prägnante Nasenwurzel
+	(+)	(+)	+	+	+	(+)	+	Flache Nasenwurzel
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Breite Nasenwurzel
+	+	+	(+)	+	♂	(+)	♂	Vorspringendes Kinn
♂	♂	+ G	♂	♂	♂	♂	♂	Kleines Kinn
♂	+	Spitze!	+	+	♂	♂	+	Lippen - Kiefer - Gaumenspalto
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Hohes Gaumen
♂	♂	♂	♂	♂	♂	+	♂	<u>Augen</u>
♂	♂	♂	+	(+)	♂	♂	♂	Nach außen ansteigende Lidachsen
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Nach außen abfallende Lidachsen
♂	♂	♂	♂	+	♂	♂	♂	Enge Lidspalten (re/li)
♂	♂	♂	♂	+	♂	♂	+	Epikanthus
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Mikro-, Anophthalmie
♂	♂	♂	-	♂	♂	♂	♂	Katarakt
♂	♂	♂	-	♂	♂	♂	♂	Kolehom
♂	♂	♂	-	♂	♂	♂	♂	Brushfield'sche Flecken
-	-	-	-	♂	-	♂	+ div.	Strabismus
-	-	-	-	♂	-	♂	♂	Nystagmus
+	+	♂	+	+	♂	♂	♂	<u>Ohren</u>
♂	♂	+ +	+ +	♂	♂	♂	♂	Tiefsetzond
♂	+ +	(+)(+)	+ +	+ +	♂	♂	♂	Absteigend
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	+	Dysplastisch
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Gehörgang eng oder atretisch
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Präaurikulares Grübchen, Amnionsaol
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	<u>Nund</u>
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Groß
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Klein
-	-	-	-	-	-	-	+	Zahnstellungsanomalien
+	(+)	(+)	+	♂	+	+	+	<u>Nacken</u>
♂	(+)	♂	♂	♂	(+)	♂	♂	Kurzer Hals
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Überschießige Nackenhaut

<u>17.</u>	<u>18.</u>	<u>19.</u>	<u>20.</u>	<u>21.</u>	<u>22.</u>	<u>23.</u>	<u>24.</u>	Erklärung
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	+	Ø	Vord.
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	+	Ø	+	an der Hinterkopf
+	+	Ø	+	Ø	Ø	+	Ø	Flache Hinterkopf
Ø	Ø	Ø	Ø	+	Ø	Ø	+	Vorwiegende Nasenwurzel
+	Ø	Ø	+	+	+	+	+	Flache Nasenwurzel
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Breite Nasenwurzel
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Vorwiegendes Kinn
Ø	Ø	Ø	Ø	+	Ø	Ø	Ø	Kleines Kinn
+ LK66	Ø	Ø	Ø	+ G	Ø	Ø	Ø	Lappen - Kiefer - Gaumenspalte
Spalte!	+	Ø	+	Spalte!	+	+	Ø	Hohes Gaumen
Ø	(+)	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	(+)	1/200
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Nach außen ansteigende Lidachsen
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Nach außen abfallende Lidachsen
Ø	Ø	+ 10	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Lange Lidachsen (re/li)
Ø	Ø	+ 1+	+ 1+	+ 1+	Ø	+ 1+	+ 1+	Epicanthus
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Mikro - Anophthalmie
Ø	Ø	Ø	+	Ø	Ø	Ø	Ø	Katarrakt
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Kolobom
Ø	+	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Brushfield'sche Flecken
Ø	Ø	+ Conv.	+ div.	Ø	/	Ø	+ conv.	Strabismus
Ø	Ø	Ø	+	Ø	/	Ø	Ø	Nystagmus
Ø	Ø	+	Ø	+	Ø	+	Ø	Ohrren
Ø	Ø	+	Ø	Ø	Ø	Ø	(+)	Tiefsetzend
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Absetzend
Ø	(+)/(+)	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	+ 1+	Dysplastisch
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Gehörorgang eng oder atretisch
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	+ 1 Gäh.	Ø	Präauriculäres Grübchen, Anhangsöl
Ø	Ø	+	+	Ø	Ø	Ø	Ø	Mund
Ø	+	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Groß
Ø	+	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Klein
Ø	+	Ø	+	/	/	/	+	Zahnstellungsanomalien
Ø	Ø	+	+	Ø	+	Ø	Ø	Nacken
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Kurzer Hals
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Überschießende Nackenhaut

25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	Koll.-Pr.
♂	♂	♂	♂	♂	+	♂	♂	Kopf
+	♂	+	+	♂	♂	♂	♂	Ausladender Hinterkopf
♂	♂	+	+	♂	♂	(+)	♂	Flacher Hinterkopf
♂	+	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Vor- / zurückgehende Nasenwurzel
+	(+)	+	+	♂	♂	+	♂	Flache Nasenwurzel
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Breite Nasenwurzel
+	(+)	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Vorspringendes Kinn
+	♂	♂	♂	♂	♂	♂	(+)	Kleines Kinn
+ G	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Lippen - Kiefer - Gaumenspalte
Spalte!	♂	+	♂	+	♂	+	+	Hohler Gaumen
♂	♂	♂	+	♂	♂	♂	+	AMGSP
♂	♂	♂	♂	♂	♂	+	♂	Nach außen ansteigende Lidachsen
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Nach außen abfallende Lidachsen
+ / +	+ / +	♂	(+) / (+)	♂	♂	♂	♂	Enge Lidspalten (ro/li)
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Epikanthus
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Mikro-, Anophthalmie
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Katarakt
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Kolobom
♂	♂	+ / +	♂	♂	♂	♂	♂	Brushfield'sche Flecken
+ conv.	—	+ div.	♂	♂	♂	—	—	Strabismus
♂	—	♂	♂	♂	♂	—	—	Kyrtismus
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Ohren
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Tiefstehend
(+) / (+)	♂	♂	♂	♂	+ / +	♂	♂	Abstehend
♂	♂	♂	♂	♂	(+) / (+)	♂	(+) / (+)	Dysplastisch
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Gehörgang eng oder atretisch
♂	+ / + Gröb.	♂	♂	♂	♂	+ / + Anhang	♂	Präaurikuläres Grübchen, Anhängsel
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Mund
♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	Groß
+	—	+	+	—	♂	♂	♂	Klein
♂	♂	♂	♂	♂	♂	—	—	Zahnstellungsanomalien
♂	(+)	♂	♂	♂	♂	(+)	♂	Naevus
♂	♂	♂	♂	♂	♂	+	♂	Kurzor Hals
								Überschüssige Nackenhaut

[illegible]

9.	II. 10.	II. 11.	II. 12.	II. 13.	II. 14.	II. 15.	II. 16.	Fall-Nr.
0	0	0	0	0	0	0	0	Rumpf
0	0	0	0	0	0	0	0	Thoraxdeformität
0	0	0	0	0	0	0	0	Rectusdiastase
0	0	0	0	0	0	0	0	Nabelbruch
0	0	0	0	0	0	0	0	Leistenbruch (re/li)
0	0	0	0	0	0	0	0	Kryptorchismus (re/li)
0	0	0	0	0	0	0	0	Abnormes Genitale
0	0	0	0	0	0	0	0	Hände und Füße
0	0	0	0	0	0	0	0	Kurze und breite Hände
0	0	0	0	0	0	0	0	Typische Vierfingerfurche (re/li)
0	0	0	0	0	0	0	0	Sidneyline (re/li)
0	0	0	0	0	0	0	0	Atypische Vierfingerfurche (Übergangstyp) (re/li)
0	0	0	0	0	0	0	0	Syndaktylie
0	0	0	0	0	0	0	0	Polydaktylie
0	0	0	0	0	0	0	0	Lange, schmale Finger
0	0	0	0	0	0	0	0	Fingerkontrakturen
0	0	0	0	0	0	0	0	Dysplastische Finger- und/oder Zehennägel
0	0	0	0	0	0	0	0	Klinodaktylie des Kleinfingers (re/li)
0	0	0	0	0	0	0	0	Kurzer Kleinfinger (re/li)
0	0	0	0	0	0	0	0	Sonstige Phalangenhypoplasie
0	0	0	0	0	0	0	0	Nur 1 Beugefurche am Kleinfinger
0	0	0	0	0	0	0	0	Weiter Abstand zwischen 1. und 2. Zehe
0	0	0	0	0	0	0	0	Plantarfurche (i. Zwischenzehenraum)
0	0	0	0	0	0	0	0	Fußdeformitäten
0	0	0	0	0	0	0	0	Zehenstellungsänderungen
0	0	0	0	0	0	0	0	Gelenke, Muskeln
0	0	0	0	0	0	0	0	Muskelhypotonie
0	0	0	0	0	0	0	0	Muskelhypertonie
0	0	0	0	0	0	0	0	KB - Befunde des Skeletts
0	0	0	0	0	0	0	0	Knochenalter unter 2 Sigma
0	0	0	0	0	0	0	0	Schädelanomalien
0	0	0	0	0	0	0	0	Rippenanomalien
0	0	0	0	0	0	0	0	WS - Anomalien
0	0	0	0	0	0	0	0	Beckenanomalien
0	0	0	0	0	0	0	0	Klinodaktylie V
0	0	0	0	0	0	0	0	Brachymecephalangi V
0	0	0	0	0	0	0	0	Anomalien am Fußskelett
0	0	0	0	0	0	0	0	Sonstiges

Brachytelephal.
(alle Finger)

Brachytelephal.
(I, II, III, IV, V)
Metatars II und
prox. ung. IV, V
metatars I hypopl.

[illegible]

87

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
0	0	ASD VSD valv. Def. Sten.	(1) Verd.	+	0	+ Thymus ect. comm.	(+) Verd.
-	-	Hydro- cephalus bei abnormer Zirkulation	-	0	-	+ Beckenhaut- Rauheit	-
normal	normal	normal	normal	normal	normal	normal	normal
+	+	+	+	+	+	+	-
0	0	0	+ myokard. Atrophie	0	(1) Verd.	0	0
0	0	0	K S.V. 8 mm	K 0	0	+	0
-	-	-	-	normal	-	normal	-
Vorspring. Glabella.	Aufgehende Naslöcher	Knotige Nase keine Protrusion	Verstärkte Stirnhaare.			Mittelschwere Falten Facialis parva links	

Fall Nr. 1

In ... en

Herz, Gefäße

Urogenitalorgane

Andere Missbildungen der inneren Organe

Augenhintergrund

Sicht

Hört

Choroid

Echoencephalogramm (Ventrikelvergrößerung)


Immunglobuline quantitativ

Weitere, bisher nicht aufgeführte
pathologische Besonderheiten

[illegible]

0 1 2	0 1 3	0 1 4	0 2 1	0 2 2	0 2 3	0 2 4	0 2 5	0 2 6
85	85	(1) Verd.	(1) Verd.	+ ASD VSD	87	(1) Verd.	88	Herz, Gefäße
89	89	—	—	—	—	—	—	Urogenitaltrakt, etc.
								Andere Mißbildungen der inneren Organe
normal	normal	normal	normal	normal	normal	normal	normal	Augenhintergrund
+	+	+	+	+	+	+	+	Sicht
Schwach	+	+	+	+	+	+	+	Hör
89	89	+ bis 9 Hm.	89	89	89	89	89	Krampfzufälle
89	89	89	89	89	89	89	89	and (A = Allgemeinsstörungen, K = Krampfzentrale)
89	89	89	89	89	89	89	89	Echoencephalogramme (Ventrikelerweiterung)
89	89	89	89	89	89	89	89	Immunglobuline quantitativ
89	89	89	89	89	89	89	89	Weitere, bisher nicht aufgeführte pathologische Besonderheiten
Damen- bakteriologische bds.		Knochen-Masse		per Störke sinn beider aufgehoben Nas Störke				

II 25.	II 26.	II 27.	II 28.	II 29.	II 30.	II 31.	II 32.	Pathol.
+ Art. lat. in	+ VSD	Ø	Ø	Ø	Ø	(+) Verd.	Ø	Immer Mißbildungen
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Herz, Gefäße
				U. v. Fehlbildung (H) des Nierenb.				Urogenitalorgane
								Andere Mißbildungen der inneren Organe
Normal	Ø	Normal	Normal	Normal	Red. Papillen-anomalie	Normal	Normal	Spaltige Defekte
								Augenhintergrund
+	+	+	+	+	+	Ø	+	Sieht
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Hört
Ø	Ø	+ mit 6. bis 8. Hagen (Kiefer)	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Krampfzufälle
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	ESG (A = Allgemeinstörungen, K = Krampfpotential)
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Schoencephalogramm (Ventrikelerweiterung)
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Immunglobuline quantitativ
								Weitere, bisher nicht aufgeführte pathologische Besonderheiten
				Vorgewölbte Stirn Rinne des Facialis-kanals links rechts	Vorgewölbte Stirn		Gesichts- asymmetrie Skoliose Kontraktur der Hüfte	



Offsetdruck-Fotodruck

J. Hogl, 8520 Erlangen, Hauptstr. 109 (Nähe Martin-Luther-Platz) Tel. 22990